

ACONITUM NAPELLUS sn

(Acon)

Grande tempesta rapidamente placata, individuo vigoroso pletorico robusto

KN : Primissimo farmaco dopo il trauma quando predominano lo spavento e lo shock
Febbre dopo esposizione a vento freddo secco dell'Est.
Agitazione, paura della morte, dolori intollerabili.

COSTITUZIONE SULF
DIATESI LUES

ETIOLOGIA Shock psicologico e traumatico (**Arn**), dopo un incidente ha paura di guidare (**Plat**). Emozione, collera (**Acon**, **Ign**, **Plat**). Esposizione a freddo ventoso, asciutto, secco (**Caust**, **Hep**, **Coloc**, **Nux-v**), febbre improvvisa da vento freddo dell'Est.

FISIOLOGIA

SI AMMALANO	
violentemente	più lentamente
Acon	Ferr-p
Bell	Gels
	Bry

Acon (come **Bry**, **Nux-v**, **Puls**) è l'acuto di **Sulph**, seguono bene anche **Arn**, **Bell**, **Bry**, **Ip**.

COMPLEMENTARE/SINERGICO Phos/Arn, Coff

INCOMPATIBILE/ANTITODO Acon : le bevande acidule (limonate, succhi di frutta, caffè, alcol) annullano la sua azione

EFFETTI INDESIDERATI ---

COMPARARE Bell, Cham, Coff, Ferr-p.

DD **Acon:** Diversità di congestione se disteso o alzato
Digitalis: Bradicardia anche alzandosi. No ipertensione.
Vipera e Phos: Polso rapido
Serum d'Anguille Bradicardia da disteso e tachicardia alzandosi
Bell **Acon** NON suda
Gels, paura → paralisi. Mentre **Acon** paura → eccitazione.

DD -- PAURA DELLA MORTE LUES	
Ha paura della morte	Acon
Ha paura del contagio che porta alla morte	Lues
Ha paura che non ci sia più nulla: assenza	Ars
Ha paura della sofferenza legata alla morte	Nitr-ac

EVOLUZIONE Sulph

MENTALE PAURA DELLA MORTE [simile a **Sulph** ed a **Ars**. Agitazione e paura della morte in SULF. Ansia, panico ad andare a letto, paura di non svegliarsi e di morire (difficoltà a lasciarsi andare - getting off). Per strada, fuga dal supermercato (folla + luce) (**Lach** è complementare : fuga dal cinema). Tachicardia].

Negli stati febbrili agitazione estrema, **ATTACCHI DI PANICO**, si getta da una parte all'altra nel letto, senso di morte imminente (**Apis**), si ritiene capace di leggere il futuro (**Phos-ac**). **Predice l'ora della sua morte** ("io non arrivo a domani") (**Apis**), chiama a soccorso il medico, si lamenta di dolori intollerabili e chiede di essere alleviato. Bocca secca; sete; tachicardia.

FOBIE, claustrofobia, agorafobia paura della folla, paura di soffocare. Paura dei terremoti. Paura della musica.

Disturbi da attacchi da panico (specie la sera). Volto atterrito. Forte spavento e terrore. Irrequietezza generale.

ANSIA IMPROVVISA, anche per gli altri (**Caust**, indirettamente **Ars**). Ansia preoperatoria (**Bell**, **Gels**, **Ign**, **Sulph**). Preventivo dell'aborto da spavento/eccitazione. Anche nei pazienti oncologici. Desiderio di compagnia.

AGITAZIONE ESTREMA (come **Ars**, **Kali-br**) (terapia: **Acon** + **Rhus-t** + **Zinc**). Deliri (In ordine decrescente di violenza: **Stram**, **Bell**, **Hyosc**, **Canth**).

MODALITÀ	Acuto che NON SUDA ed ha sete di acqua fredda (Bell). Acqua con gusto amaro. Avversione ad essere toccato. Freddo gelido, Piedi ghiacciati . Palmo delle mani caldissimo , tremito alle mani, dolori alle dita. Si ammalava violentemente (Bell) [si ammalano lentamente Ferr-p, Gels, Bry]. NON E' INFETTIVO, NON E' PERIODICO, NON PUS.
<u>Aggravamenti:</u>	Freddo secco (Nux-v, Caust). Con l'esposizione al vento . Dopo che il disturbo si è manifestato sta peggio con il caldo. La sera, la notte, verso mezzanotte . Se toccato ha una reazione forte (Apis, Arn, Ars). Decubito sul fianco sn , e sul lato dolente (In caso di conflitto: La seconda modalità ha la priorità sulla lateralità). Peggiora con le emozioni (Arg-n, Cocc, Coff, Coloc, Gels, Hyosc, Ign, Kali-p, Nux-v, Phos-ac, Puls, Staphy). Peggiora con la paura (Gels, Ign, Op, Veratr). La musica provoca paura ed aggravamento dei sintomi mentali (ha un udito fine).
<u>Miglioramenti:</u>	Quando inizia la sudorazione, allora non sarà più Acon , ma Bry o Bell . (migliorano con il sudore Acon, Bry, Calc, Cham., Rhus-t, Veratr). All'aria aperta (non isterici che migliorano all'aria aperta). Riposo
<u>Periodicità</u> (caratteristica PSO):	NON E' PERIODICO
<u>Lateralità</u>	sn
<u>Avversioni:</u>	Acciughe (pesce salato).
<u>Desideri:</u>	Sete intensa per bevande fredde. Pesce.

SINTOMI GENERALI

ESORDIO BRUTALE : comparsa improvvisa dei sintomi dopo esposizione a freddo secco o per passaggio dal caldo al freddo. ANSIA agitazione paura, febbre elevata dopo, congesto da sdraiato pallido da seduto, brividi, miosi, sete intensa. Peggiora in un ambiente caldo. Facies ansiosa preoccupata ansiosa congesta a volte con una guancia rossa e l'altra pallida personalità ansioso-fobica: continuamente incline alla paura, all'eccessiva prudenza e a numerosi timori irragionevoli. BRIVIDI solo su metà del corpo, eccitazione, paura, una guancia rossa l'altra pallida (**Puls, Cham** e **Lac-c** [alternanza]). Spesso AGITATO con necessità di movimento. Soggetti forti pletorici sanguigni sedentari che ammalano brutalmente e si indeboliscono notevolmente.
Cute secca NON SUDA. Beve acqua fredda che sente amara. Sangue violento a getto. Stato di ansia e di angoscia mentale e fisica. Esordio IPERACUTO della malattia. Improvvisa agalattia dopo esposizione a freddo secco, con forte ansietà Sensazione di torpore.
DOLORI (articolari, NON oteo-muscolari) acuti, contusivi, intollerabili, ipersensibilità al dolore (**Bell, Cham, Coff, Hep, Hyper, Ign, Nux-v**) di notte con intorpidimento e formicolii, generalmente dopo un'esposizione all'aria fredda e secca. Agitazione estrema con ansia, il malato caccia dei gemiti, dichiara di essere perso e predice anche il giorno e l'ora della sua morte. Sempre > dopo aver traspirato/sudato.
CRONICO: NON ESISTE.
Sensazione di torpore (**Acon, Lyc, Plat, Rhus-t, Sec**).

SINTOMI LOCALI

<u>Colpo di calore:</u>	Dopo prolungata esposizione diretta al sole : svenimento e vertigini con mal di testa. Ansioso, irrequieto, dice di sentirsi morire.
<u>Influenza:</u>	Esordio improvviso brutale e subito elevata con grande freddolosità specie dopo esposizione a freddo secco . Brivido se scoperto o toccato. Calore secco . Estremità fredde . Miosi . Sete intensa . Peggiora di notte. Grande irrequietezza fisica e terrore panico della morte. Bisogno di avere qualcuno vicino. Preventivo della febbre reumatica (Acon, Dulc, Sulph).
<u>Mal infettive:</u>	Parotite epidemica (Abrot, Acon, Bell, Phyt, Puls). Complicanze di parotite, orchite e mastite (Carb-v). <u>Morbillo</u> elimina scorie TUB .

Infatti, dopo il morbillo è facile prendere la tbc. Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa **Avia**

- Acon, Bell** (CARB/SULF, infiammazione), **Sulph, Puls** (MUR/FOSF, stimolatore), Ruddock : **Puls** al mattino e **Acon** la sera x7-10 gg.
- SNP: Inizio rapido esposizione a freddo secco, vento *Paralisi a frigore* (paralisi di Bell faciale VII) : **Acon** poi **Caust.** fino a 2-3 gg.
Nevralgie post-traumatiche (con **Arn**).
- Cute: Rossa calda secca bruciante. Morbillo. Porpora miliare. Arida fino all'ittiosi (**Ars, Ars-i, Bell, Plb, Sil, Thuja** [grasso il volto secchi gli stinchi]).
Psoriasi : LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazione delle unghie, psico-neurologico) (**Calc, Lyc, Nux-v, Puls, Bell, Kali-a**).
- Testa: Vertigini. Svenimenti alzandosi o stando in piedi. Cefalea con sensazione di scoppio, di pressione endocranica, bruciante durante la febbre o dopo soppressione di una corizza.
- Occhi: Rossi e infiammati con palpebre gonfie dure e rosse. Congiuntivite inizialmente secca, secrezioni abbondanti acquose. Fotofobia. Lacrimazione dopo vento secco, da riflesso della neve. Corpi estranei o ferite nell'occhio (**Arn**). **Cecità improvvisa e/o perdita di udito dopo spavento.**
Orzaio [Orzaio esterno: ghiandola di Zeiss - Orzaio interno: ghiandola di Meibomio. Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma] (TUB con un poco di attività SULF).
Calazio (Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio, Torpido, quindi più TUB). Calazi caldi : antiflogistici + **Acon**.
- Orecchio: Ipersensibilità ai rumori. Dolore ed infiammazione acuta dell'orecchio **[sn]**. Otite media a rapida comparsa con dolore intenso e febbre alta nelle prime 24 ore (poi **Bell**), padiglione auricolare gonfio rosso caldo dolente, Dopo esposizione a freddo secco e/o vento. Fase iniziale senza sudore, NON suda. Grande agitazione. (Bambini : **Puls + All-c, Mang, Caps, Chinin-s**, bambini scontrati: **Cham**).
- Naso: Ipersensibilità dell'olfatto. Corizza al primo stadio acquosa a scarsa. Starnuti frequenti. Epistassi. Mucosa nasale secca, naso chiuso. Prurito alle narici.
- Volto: Rossa calda bruciante, diventa pallida alzandosi, **una guancia rossa l'altra pallida (Cham)**. Nevralgia specie **[sn]** con formicolio ed intorpidimento della parte interessata. Nevralgia del nervo faciale con forte dolore. *Paralisi del faciale a frigore*.
- Bocca: Secca intorpidita formicolante. SETE INTENSA. Muove costantemente la mandibola come se masticasse. Lingua bianca. Mal di denti dopo esposizione a freddo secco. Anche gola rossa e secca. Faringiti e tonsilliti con le modalità del rimedio. **Sapore amaro in bocca (Merc, Nux-v, Puls, Rhus-t, Lyc)**.
- Cardiocircolatorio: Coronaropatia arteriosclerotica (psiche, obesità, tabagismo). Angor, angor da sforzo (**Acon, Cact**), angor spontaneo notturno, angor spastico da freddo. Angina e infarto miocardico acuto con intorpidimento del braccio **[sn]**. Tachicardia dopo uno spavento. Peggioramento notturno. Polso rapido corto duro. Angoscia, paura della morte. **Dolore precordiale** aggravato dal freddo e dal camminare contro vento. È l'acuto di : **Sulph, Nux-v, Aur**.
Scompenso cardiaco : Sono sintomi che si accompagnano alle prime fasi di uno scompenso non complicato da malattie cardiache se non da ipertrofia del cuore e da uno stato di congestione arteriosa di tutto il sistema cardiovascolare (**Acon, Aur, Iod, Verat**).
Aortite acuta (LUES, 60-70% SULF). Farmaci vascolari LUES : **Acon, Ars, Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**.
Ipertensione arteriosa. Rimedio arteriolare (spasmi) iperacuto (Acon). Colpo di freddo, formicolio e addormentamento delle dita e del braccio **sn (Cact, Kalmia, Rhus-t)**. Polso duro pieno frequente, tachicardia, dolori lancinanti. PAURA DI MORTE IMMINENTE.

Ipertensione può essere SIC o LUES

L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : **Acon, Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc**).

Per il LUES complementare profondo di **Rhus-t** è **Aur** (sclerosi vascolare), mentre

Per la SIC è **Natr-s** che ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare

Respiratorio:

Raffreddore (**Nux-v**, **Acon**, **Camph**). Improvvisa afonia dopo esposizione al freddo asciutto o dopo spaventi o emozioni. Faringotonsilliti : stati infiammatori immediatamente conseguenti all'esposizione a freddo secco (Tramontana). Tracheo-bronchiti. Inizio brutale. Il volto del paziente è arrossato e scottante. Cute secca. Temperatura subito alta. **Stato di ansietà smisurato all'evento**. Dura alcune ore poi il quadro evolve (Blackwood: **Baryta**).

Influenza, tracheobronchiti, polmoniti a rapida insorgenza con grande irrequietezza. Tutte le malattie al loro esordio. Tosse secca rauca tipo croup. Fastidio all'aria inspirata, si stringe la gola ad ogni colpo di tosse. Dispnea peggiorata decombendo a sn. Emottisi. Rimedio dello stato iniziale di croup (**Acon** e **Apis**). Peggiora di notte dopo mezzanotte.

PATOLOGIE RESPIRATORIE IMPROVVISE	
Subito	Acon
Dopo 1 giorno	Hep
Dopo parecchi giorni	Carb-v , Sulph

Digerente:

Gastrite. Dolori addominali periumbelicali durante l'evacuazione. Epatite acuta. **Grande sete solitamente per bevande fredde**.

Gastroenterite acuta febbrile: si usa immediatamente. Dopo colpo di freddo. Specie nel lattante e nel bambino. Rapida ipertermia in soggetto che non suda, particolarmente agitato, con intensa sete per acqua fredda.

Diarrea verdastra, feci vischiose come spinaci tritati. Coliche brusche dopo esposizione a vento freddo e secco che obbligano il malato a **piegarsi in due**, senza sollievo (con sollievo: **Coloc**).

DD: **Gels** (Diarrea acquosa con flatulenza dopo emozioni o paure con debolezza delle gambe e delle risorse intellettuali. Paura → defecazione "L'ho fatta sotto dalla paura") un grado meno grave della paura rispetto ad **Acon**.

Urogenitale:

Orchite. Ritenzione urinaria. Ritenzione urinaria di madri e lattanti nel dopo parto. Infezioni delle vie urinarie. Colica renale dopo esposizione a freddo.

Ortopedia/Reumatol:

Primissimo farmaco DOPO IL TRAUMA (contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale) quando predominano lo spavento e lo shock, presenti anche debolezza muscolare, debolezza paralitica degli arti, intorpidimento. RAA (**Acon**, **Dulc**, **Sulph**).

LOMBOSCIATALGIE con paura. Attacco improvviso violento con dolore acuto torpore prurito. Può insorgere dopo esposizione a freddo secco. Farmaco con prevalenza sn.

ARTRITI a comparsa improvvisa. Intorpidimento degli arti, artrite reumatoide, artrite settica, artrite gottosa, febbre reumatica. **Acon** NON per dolori osteo-muscolari MA articolari (**Arn** traumi, **Ruta** periostio, **Rhus-t** tendini dei muscoli).

Dolori articolari <u>improvvisi</u> (più improvviso di Arn , ma in Arn c'è un trauma nel 90% dei casi) gravi dopo esposizione a <u>freddo secco</u> (90% dei casi sciatore). Spesso febbre alta. Articolazioni calde e sensibili al tocco. Paziente molto <u>impaurito</u> .	Acon
RAA con indolenzimento generale di tutto il corpo. C'è un trauma nel 90% dei casi, politraumatizzato, anche microtraumi (tassista). Peggiora dopo esposizione al <u>freddo</u> (Acon), al contatto, con gli scossoni, con il movimento (dolore), ma non può stare fermo, non riesce a trovare una posizione. Non frequentissimo nella patologia cronica. Si usa nel reumatismo GOTTOSO in riacutizzazione. Segni fisici e mentali come sopra.	Arn
Articolazioni calde rosate gonfie con tessuto imbibito. Peggio con il movimento e con il calore. <u>Meglio con applicazioni fredde</u> . Paziente in allarme, ma non agitato come Acon ed Ars .	Apis

Ginecologia:

Emorragie uterine. Farmaco del travaglio di parto (paura immotivata di morire).

Amenorrea improvvisa, dopo spavento o dopo aver preso freddo asciutto, in persone robuste, pletoriche, con capelli e occhi neri. Ansietà marcata con agitazione. Aborto da spavento/eccitazione.

Improvvisa agalattia dopo esposizione a freddo secco, con forte ansietà.

Ritenzione urinaria

SINTESI CLINICA

Grande tempesta rapidamente placata, individuo vigoroso pletorico robusto.

Agitazione, paura della morte, dolori intollerabili.

Febbre dopo esposizione a vento freddo secco dell'est (*paralisi a frigore* del nervo faciale).

Paura della morte, predice l'ora della sua morte ("*io non arrivo a domani*"), chiama a soccorso il medico.

Fobie. Attacchi di panico (specie la sera), Agitazione estrema

Esordio brutale, iperacuto, non suda, panico, dolori intollerabili. NON E' INFETTIVO, NON E' PERIODICO, NON PUS. Piedi ghiacciati. Palmo della mano caldissimo.

PATOLOGIE

Qualunque patologia improvvisa acutissima con le caratteristiche descritte.

TERAPIA/DOSE

In caso di uso di ACON	dopo l'attacco acuto	Sulph, Chin, Calc, Calc-p
	o in caso di ricaduta	il rimedio di base

Acon va assunto già da 3 giorni prima dell'evento alla 30 CH, poi si associa **Gels** la sera prima e la mattina dell'evento alla 5 CH.

Scompenso cardiaco : risposta rapida con 30 CH ogni 15 min. se il rimedio è giusto migliora alla II° somministrazione → ogni 30 min, se migliora ancora → ogni 30 min → ogni ora (come nelle coliche e come nell'asma)

Aortite acuta : **Acon** 5 CH x 3-5

Faringotonsilliti : **Acon** dose unica 200 CH anche quando non c'è febbre.

TERAPIA DEGLI AGITATI : **Acon** + **Rhus-t** + **Zinc**.

NOTE

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html	
Dopo vaccinazione caratteristica brutale sintomatologia	Acon