

AETHUSA CYNAPIUM (Aeth)

La caratteristica principale di **Aeth** è la **violenza**, che evoca **Stram** e **Bell**. Violenza nei vomiti, nei dolori e nel delirio, oltre ad una **ipersensibilità neurosensoriale** a luce, rumori, contatto, vibrazioni e correnti d'aria. Il secondo sintomo generale è la profonda **prostrazione**, sia nelle malattie acute che croniche, pari solo a quella di **Gels**, **Ail** e **Merc-c**.

Intolleranza al latte : Danni tossici soprattutto a carico del sistema nervoso e digerente. Gastriti catarrali acute, nausea e vomito. Diarrea, rigurgiti (lattante). Esofagospasmo. Gastroenterite.

KN : Turbe dell'attenzione e della memoria in bambini affetti da vomito, diarrea ed intolleranza al latte

COSTITUZIONE CARB

DIATESI TUB

FISIOLOGIA **Intolleranza al latte, danni tossici del SNC, freddoloso tipo TUB.**

COMPLEMENTARE/SINERGICO Calc, Sulph-i.

COMPARARE Ant-c, Calc, Ars, Cic.

DD **Aeth**: intolleranza al latte con vomiti violenti. **Aeth** è un rimedio eccezionale per tutti i sintomi locali e generali gravi, quando accompagnati da violenza e prostrazione "*non ce la faccio*".

Avversione al LATTE (che fa male)

Sep, Natr-c, Natr-m, Natr-p, Mag-c vomito acidissimo dopo averlo bevuto e diarrea acida, **Lac-c, Aeth** più vomito, **Ant t, Brom, Carb-v, Chin, Puls, Sil** non tollera il latte materno, **Sulf, Valer**.

I CARB (**Calc**) bevono poco latte.

AGISCE SN e Digerente

SINTOMI GENERALI Danni tossici soprattutto a carico del SN e Digerente.

Lattanti Magri malnutriti (MUR/FOSF). Intolleranza al latte vaccino e materno (vomito, diarrea e rigurgiti). Rigurgito occasionale, di piccole dimensioni e viene provocato da un cambio repentino della posizione corporale o da una pressione sul pancino, involontaria, del neonato.

Grande rimedio delle **gastroenteriti del lattante**, in particolare se estive e in corso di dentizione, quando siano accompagnate dalla violenza e la prostrazione tipiche con grave rischio di disidratazione: sonnolenza, sudorazione, profonda astenia e incapacità di reagire. Uno stato stuporoso con pallore e sudorazione costituiscono il quadro, in particolare nel lattante.

Neonati/bambini che vomitano il latte con feci liquide giallo-verdastre. Rischio di morte in 2-3 giorni. Delirio e sovraeccitazione. Malnutriti.

Bambino Turbe della crescita (adenite tubercolare). Disattento in classe **DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO**. Linfonodi marcati. Afte. Poco appetito. Astenico. Intolleranza al latte vaccino e materno (vomito e diarrea, più vomito di latte coagulato). Coliche violente (tipo **Veratr**).

Adolescente Astenico vomito e diarrea: Intolleranza al latte. Malnutrizione. Mangia poco e spesso. Assenza di fame. **INCAPACE DI STUDIARE**.

Adulto Turbe dispeptiche. Dimagrimento. Eruzioni (PSO). Herpes (TUB). pre-tubercolosi (LUES).

MODALITÀ **Freddoloso, ma migliorato all'aria aperta (modalità TUB: Puls)**. Freddo all'addome. Assenza di fame. Totale assenza di sete. Avversione al latte.

FREDDOLOSO che peggiora con il **caldo**

- **Aeth**
- **Carb-v** è freddoloso con desiderio di **aria fresca**
- **Natr-c**: freddoloso che però non sopporta il **calore radiante** (sole, termosifone, areatore)
- **Puls** freddoloso non sta male con il calore radiante e **Calc** è meno caloroso
- **Sulph** può essere freddoloso, ma, nel letto, ha i **piedi** che **scottano**
- **Psor** è freddoloso ed ha i **piedi gelati** nel letto
- **Natr-m** peggiora con il **sole**

Aggravamenti: Dentizione (**Aeth**, **Bell**, **Bor**, **Calc**, **Calc-p**, **Cham**, **Kreos**, **Magn-p**, **Phyt**, **Pod**, **Rheum**).
 Vomito (**Aeth**, **Ars**, **Ant-t**, **Ip**).
 Latte, latticini e alimenti salvo le zuppe. Vomito e diarrea dopo il latte (come **Ars**, **Ant-t**, **Ip**). **Freddoloso che peggiora con il caldo (TUB)**.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF-MUR/TUB					SULF/PSO	
↓← ↑→ Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastro. Migliora mangiando			→↓ Calc Vomito e diarrea	
↓			← Triade di Kent		↓	
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree			Mag-c	
					Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓					↓	
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Capillari nicali, beve aceto		↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	China Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
 →	→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte			←	←
		↓				
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				
AA aggiungono						
Lac-def	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy						

Miglioramenti: Aria aperta

MENTALE

Alternanza di eccitazione e sonnolenza per assorbimento tossici. Anche EPILESSIA. e SINDROME BIPOLARE (si usa **Aeth** nella Sindrome Bipolare solo se c'è intolleranza al latte).

Ipersensibilità estrema di **Aeth** e la violenza dei sintomi, quasi una rinuncia a combattere.

Persone riservate con forti emozioni interiori. Dedicano tutta la vita agli animali. Paura di addormentarsi perché pensano di non risvegliarsi. Paura degli interventi chirurgici. Parlano spesso a voce alta con sé stessi. Autismo.

Ha dimostrato sintomi mentali di mancanza di fiducia, sentimenti di inadeguatezza allo standard sociale, tipico del gruppo di rimedi delle ombrellifere (**Aegop**, **Am-c**, **Angelica**, **Ap-g**, **Asa-f**, **Aeth**, **Cic**, **Con**, **Ery**, **Foen**, **Hera**, **Hydrc**, **Oena**, **Past**, **Petros**, **Phel**, **Pim**, **Sanic**, **Sumb**, **Ziz**).

SINTOMI LOCALI

SN:

Ansia, agitazione. Prostrazione, sonnolenza. Convulsione con rotazione dei bulbi oculari verso il basso. Sindrome pseudo vertiginosa con cefalee e disturbi dell'attenzione

PARALISI CEREBRALE

Spasmi epilettici con i pollici stretti, rosso, faccia, occhi e visione rivolti verso il basso, pupille fisse e dilatate; la schiuma alla bocca, mascelle bloccate, polso piccolo duro veloce.

Aeth

Digerente:

Intolleranza al latte (bambino CARB) che viene vomitato appena bevuto con forti conati. Gastroenterite dei lattanti. Intolleranza al latte vaccino. Gastriti catarrali acute, nausea e vomito. Gastroenterite. Esofagospasmo. Disturbi del comportamento alimentare. Feci diarroidiche giallo-verdastre, non fetide.

SINTESI CLINICA

CARB/TUB

Intolleranza al latte. Che provoca danni tossici soprattutto a carico del SNC e Digerente.

Turbe dell'attenzione e della memoria in bambini affetti da vomito, diarrea da intolleranza al latte

Paziente freddoloso tipo TUB.

Difficoltà di apprendimento/ difficoltà a studiare. Gastriti catarrali acute, nausea e vomito. Diarrea, rigurgiti (latitante). Esofagospasmo. Gastroenterite.

La caratteristica principale di **Aeth** è la **violenza**, che evoca **Stram** e **Bell**. Violenza nei vomiti, nei dolori e nel delirio, oltre ad una ipersensibilità neurosensoriale a luce, rumori, contatto, vibrazioni e correnti d'aria. Il secondo sintomo generale è la profonda **prostrazione**, sia nelle malattie acute che croniche, pari solo a quella di **Gels**, **Ail** e **Merc-c**.

TERAPIA

Astenia	Cerebrale, prima degli esami	Aeth
	Muscolare (degli scalatori)	Coca