

ALUMINA PHOSPHORICA

(Alum-p)

Serve nel caso di paralisi agli arti inf

COSTITUZIONE SULF-MUR

ETIOLOGIA Effetti cronici dell'ansia.

COMPLEMENTARE/SINERGICO si accompagna ad **Ign** e **Gels**

MENTALE Carattere mutevole. Agitazione da diversi giorni prima dell'appuntamento, freddoloso, molto nervoso, insicuro, trema quando ha paura. Sensazione di angoscia nel petto e nodo in gola. Frequenti sospiri. Sintomatologia contraddittoria (digerisce bene un pasto pesante, male uno leggero). Soffre quando non ce ne sarebbe motivo.
Ign (30 CH 3 gg prima dell'evento) e **Gels** (la sera prima e la mattina alla 5 CH), per vincere gli effetti cronici di una sindrome ansiosa. Se cronicizzazione si aggiunge **Alum-p**.

MODALITÀ: Desiderio ossessivo di mangiare, famelici anche dopo mangiato (come **Ign**, **Arg-n**, **Ars**, **Alum-sil**).

Aggravamenti: Freddolosi ma preferiscono l'aria aperta e peggiorano al caldo.
In tarda mattinata, in pomeriggio, dopo mezzanotte.
Dopo mangiato bevande fredde, cibi caldi, **patate**.
Dopo aver dormito.

Avversioni: Birra, carne, fumo.

Desideri: Caffè, frutta, cibi aciduli.

SINTOMI GENERALI Forte anemia, torpore di singole parti del corpo, anemia sideropenica.

SINTOMI LOCALI

SNC: Cefalee

SNP: Paralisi degli arti inferiori, paralisi delle palpebre superiori, nervo ottico. Altre paralisi.
Tremori. Spasmi.

Cute: Di tutto. Suppurazione delle palpebre superiori.

ORL: ORL

Digerente: Di tutto

Urinario: Di tutto

Genitale: Impotenza, avversione al coito.

SINTESI CLINICA

SULF/MUR Effetti cronici dell'ansia. Si accompagna ad **Ign** e **Gels**.

Agitazione da diversi giorni prima dell'appuntamento, freddoloso, molto nervoso, insicuro, trema quando ha paura.

Desiderio ossessivo di mangiare, famelici anche dopo mangiato.

Si usa nel caso di paralisi agli arti inf.