

ANACARDIUM ORIENTALIS

(Anac)

Insicurezza. Aggressione da insicurezza. Arriva alla scissione di personalità da insicurezza.

Scompenso totale del FOSF. Sdoppiamento di personalità, distacco dalla realtà.

Davanti gli estranei è un angelo (come **Lyc**), è complementare più aggressivo e più insicuro di **Lyc**.

Obesità del FOSF (i FOSF ingrassano sull'addome)

Ingrassamento psichico con iperfagia – non gli piace il cibo. Anoressia.

PSICHE E DIGERENTE

KN :

Migliora mangiando

Sensazione di avere un cerchio o una benda intorno a una parte del corpo, oppure una pressione interna.

COSTITUZIONE

MUR-FOSF

DIATESI

LUES

ETIOLOGIA

Emozioni (**Calc, Gels, Ign, Arg-n, Lach**). Sovraffaticamento intellettuale in soggetti ansiosi molto indecisi, inclini ad accessi intensi di collera da dieta strettissima o da sovra-alimentazione.

Acon dopo gli incidenti nella paura di guidare, Op stipsi, soglia del dolore alta, problemi dopo la paura quando la rivive.

FISIOLOGIA

I FOSF ingrassano sull'addome.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Lyc, Puls /**

INCOMPATIBILE/ANTITODO **--- / Coff, Eucal, Rhus-t**

COMPARARE

Rhus-t, Chel.

EVOLUZIONE

verso **Lyc**, anche **Plat** segue bene.

MENTALE

Stato mentale migliora sempre durante il pasto.

Bambino con ritardo mentale (**Agar, Anac, Arg-n, Baryta, Bufo, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m, Nux-v, Phos, Sil., Zinc**). Deterioramento cerebrale. Incapacità di concentrazione, deficit mnemonici (**R51**).

Bambini che distruggono tutto, cattivi con la famiglia mentre di fronte ad estranei sono angeli (**Lyc**).

Bambini che distruggono tutto	
senza dolo	Ars-i
hanno bisogno del buco	Mercuriali
davanti agli estranei sono angeli	Lyc, Anac (Anac crescendo è un Lyc)

Lo studente non sopporta alcun lavoro cerebrale che gli procura immediatamente una pensosa cefalea orbitale che, tuttavia, **migliora mangiando**. Deve mangiare per migliorare l'umore, è la grande caratteristica delle manifestazioni di **Anac**, si tratta di disturbi psichici, nervosi o anche gastrici, essi > sempre con il riposo.

Adulto. Scompenso totale del FOSF. distacco dalla realtà. Insicurezza

fase stenica

- Avversione alla compagnia (**Anac, Baryta, Gels, Ign, Natr-m, Nux-v**).
- Sonnambulismo (**Phos, Hyosc, Stram, Nux-v** – troppe sostanze stimolanti-).
- Perdita brusca di memoria, negli anziani o nelle persone sovraffaticate e nervose, elucubratore psichiatrico (**Natr-m** elucubratore costruttivo). Confusione mentale, indecisione, abulia, debolezza di tutti i sensi, ipocondria, nevrosi. Illusioni. Allucinazioni.
- Contraddizione tra volontà e ragione è perfettamente sgradevole con le persone che ama e rispetta e gentile con quelli che detesta, pur rendendosi conto del proprio comportamento non può modificarlo. Il soggetto si sente come se avesse due volontà contraddittorie, una che lo comanda a fare ciò che l'altra gli proibisce.
- Disposizione alla malignità e incline alla cattiveria. Durezza, rabbia, violenza verso persone o animali. Desiderio di maledire e di bestemmia. Sospetta di ogni cosa intorno a lui. Crede di essere perseguitato, bisogno irresistibile di correre di fuggire.
- Ha sensazioni di inferiorità e crudeltà, MENTRE IN PRESENZA ALTRUI ha sentimenti di perdita della propria autostima e devalorizzazione, sfiducia in sé stesso e negli altri.
- Ha carattere bizzarro, ride per argomenti seri ed è serio per cose risibili. Desiderio di mettersi alla prova.

fase astenica

Ad un livello più grave appaiono :

- Sdoppiamento della personalità con doppia o tripla personalità.
- Allucinazioni sensoriali e ossessive (ad es. odore di legno bruciato, odore fecale, ecc.), vive come in un sogno. Sogni di fuoco (**Hep, Mag-c, Mag-m**).
- Depressione con tendenza al suicidio. Paura del fallimento. Paura che qualcuno sia dietro di lui. Indecisione. Tendenza all'abuso di alcool e droghe.
- Assenza di valori morali. A volte ha un comportamento immorale. Carattere sudicio, malvagio (**Nitr-ac**). Imbecillità, strani concetti, irritabilità, parolacce, bestemmie.

Ad un livello ancora più grave :

- Psicosi. Psicotico che non modifica il comportamento perché non si ricorda della personalità precedente. *Insicurezza psicotica*. Scaltro nella sua pazzia.
- Schizofrenia allucinazioni (*quando torna mio padre sento le voci*), delirio blasfemo (ad es. bestemmia e giura) con deliri di persecuzione. Durante la visita colloquiano con sé stessi.

MODALITÀ

Iperfagia. Fame di notte (**Phos, TK, Ant-c, Psor, Natr-c, Petr, Lyc**). Appetito esagerato CON aumento di peso, deve mangiare per migliorare l'umore (FOSF). Mangia e beve velocemente e avidamente. Mangia ma non vorrebbe. Ha fame e mangia in quantità eccessive salvo il pentirsi e mettersi a digiuno il giorno dopo, alternanza di digiuni e cospicui pasti. Anoressia.

Obesità	
Ars	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte superiore del corpo	Ingrassa		Calc , ipotiroidismo
Addome superiore	Ingrassa	Ant-t maiale della costituz CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc
Addome inferiore	Ingrassa		Ant-c, Lyc
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	

Aggravamenti:

Con il lavoro intellettuale (provoca immediatamente cefalea orbitale) e a stomaco vuoto.

Miglioramenti:

A stomaco pieno. Anche le cefalee migliorano a stomaco pieno, dopo mangiato (**Iod, Chel, Petr**) e mangiando (**Psor, Ant-c**: -la testa funziona, ma l'intestino peggiora-).

Questa modalità concerne tutte le manifestazioni di **Anac** le principali si incontrano nella mentalità e nell'apparato digerente. La depressione nervosa con perdita di memoria, volontà, tendenze impulsive, migliora durante i pasti come anche i fenomeni dispeptici di pesantezza, i dolori gastrici e anche le nausee e i vomiti.

Di sera (**Borx, Lob, Nux-v**), di notte (**Med**).

SINTOMI GENERALI Debolezza paralitica. Insicurezza → ansia di scelta → incapacità di decisione → schizofrenia. Cambio di ruoli (*non desiderano tutte e 2 le cose, ma cambiano ruolo*).
Sindromi gastriche (gastrite, ulcere), stitichezza con stimoli inefficaci, emorroidi. Bulimia degli obesi
Spossatezza dopo eccessi sessuali.

SINTOMI LOCALI

Cute: Eruzioni vescicolo-pustolose e flittenulari (come **Rhus-t**). Verruche sul palmo della mano (come **Natr-m**). Edema orticarioide da contatto con edera velenosa (**Tanac**, **Rhus-t** 30 CH, **Anac** 6 CH).

SN: Forti cefalee con disturbi digestivi, caratterizzata da una sensazione di pressione e di peso, localizzata più spesso sul **bordo oculare**. Cerchio alla testa. Esso è **aggravato da ogni lavoro intellettuale**, si incontra di preferenza negli studenti e migliora mangiando.
Gravi turbe del SN e della memoria. Epilessia. Schizofrenia. Incertezza ed instabilità sino allo sdoppiamento della personalità. Tremori, tetano.

Respiratorio: Corizza secca cronica.

Digerente: Dolori di stomaco al termine della digestione che si calmano mangiando ma ritornano dopo 2 ore. Coliche nella regione periombelicale con tendenza alla stipsi, sensazione di gran peso nell'ano "*Tappo nel retto*", come se un tampone premesse sull'intestino (**Calc** stitico senza colite). Tenesmo con defecazione difficile, inappagante. Inerzia del retto. Con lo sforzo il desiderio passa. Impulsi contraddittori.

Urogenitale: Sensazione di pesantezza profonda e costrizione intorno alla vescica (**Lach** sensazione di biglia nella vescica). Ipersessualità. Desideri sado-maso.

SINTESI CLINICA

MUR-FOSF/LUES. Insicurezza. Aggressione da insicurezza. Arriva alla scissione di personalità da insicurezza. Scompenso totale del FOSF. Sdoppiamento di personalità, distacco dalla realtà. Stato mentale ➤ sempre durante il pasto.
Obesità del FOSF (i FOSF ingrassano sull'addome). Ingrassamento mentale, non gli piace il cibo. Iperfagia. Anoressia.
Debolezza paralitica. Insicurezza → ansia di scelta → incapacità di decisione → schizofrenia. Cambio di ruoli.

PATOLOGIE

Cefalea. Complesso d'inferiorità. Depressione. Disturbi del comportamento. Eczemi. Gastrite. Paranoia. Reazione cutanea da contatto (come **Rhus-t** o **Rhus-v**). Schizofrenia. Sindrome maniaco-depressiva. Ulcera peptica. Si utilizza anche quando c'è una familiarità psicotica prima dei sintomi conclamati.

TERAPIA/DOSE Edema orticarioide da contatto con edera velenosa (**Tanac**, **Rhus-t** 30 CH, **Anac** 6 CH).
Si usava per curare le turbe di memoria