

BELLIS PERENNIS

(Bel-p)

KN : **Infiammazione dei FOSF da trauma**
COSTITUZIONE FOSF
COMPARARE con : **Arn, Ars, Staphy, Ham, Bry, Vanad.**

MENTALE Insonnia con risveglio precoce

MODALITÀ

Aggravamenti: Freddo secco, bevande fredde. Dopo raffreddamento, Bagni caldi.

Miglioramenti: Applicazioni fredde sulla parte colpita (**Apis**). Sfregamento, massaggio della parte colpita. Calore.

SINTOMI GENERALI

Traumatologia

Traumi interni profondi, tumefazione da trauma con coinvolgimento dei linfonodi locali, dopo alcuni giorni. Traumi della mammella, del coccige, dei piccoli vasi.

Contusioni e distorsioni con ecchimosi, fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale. Stravasi di sangue.

Ferite muscolari profonde, operazioni addominali e pelviche. Traumi da intervento chirurgico e contusioni del tronco, Traumi chiusi anche addominali. Contende con **Arn** il trattamento dei traumi chirurgici.

Specifico per cancro mammario da trauma. Azione profonda simile ad **Arn** ma specifico per i traumi della mammella.

SINTOMI LOCALI

Volto: Soprattutto **acne**. Epistassi da trauma.

Mammelle: Traumi della mammella seguiti da tumefazione dei linfonodi prossimali con possibile freddezza degli arti.

Cancro mammario successivo a trauma : post-intervento: per riassorbire gli edemi, diminuire il dolore e la sintomatologia legata all'anestesia.

Addome: Indolenzimento dei muscoli addominali o pelvici anche in gravidanza. Si può irradiare agli arti inf ed associarsi a congestione venosa.

Estremità: Distorsioni con ecchimosi, rigidità.

Reumatologia: Patologie articolari acute : Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, RAA:

Infiammazione acuta improvvisa delle articolazioni dopo freddo secco. Artrite post-traumatica. Reumatismo dei vecchi lavoratori. (contende ad **Arn** il trattamento dei traumi chirurgici).

SINTESI CLINICA

Infiammazione del FOSF da trauma.

Si usa in tutta la traumatologia con lesioni profonde, contende ad **Arn** il trattamento dei traumi chirurgici: contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale.

Specifico per cancro mammario da trauma.

TERAPIA/DOSE Si associa **Arn** + **Staphy** per il taglio chirurgico.