

BERBERIS VULGARIS

(Berb)

Elemento principale è la **Berberina** che si trova nell'**Hydr** (drenante ed antitumorale), nel **Chel** (abbassa il colesterolo), in **Podo** e in **Caul**.

Drenaggi per le patologie articolari croniche: **Chel**, **Lyc**, **Berb**, **R7**.

KN :	Dermatiti cercinate e patologie renali.
COSTITUZIONE	CARB/SULF. Biotipo pletorico.
DIATESI	<u>SIC</u> -LUES • Tendenza PSO (ancora buoni eliminatori). • Diatesi gottosa e urica, intossicato (Lyc). • Anti-SIC → antitumorale.
FISIOLOGIA	Ottimo <u>drenante</u> renale, epatico cutaneo. Terreno gottoso (gotta cronica Sars , Berb). Sovraccarico renale.
COMPLEMENTARE/SINERGICO	Sulph
INCOMPATIBILE/ANTITODO	--- / Camph , Bell .
COMPARARE	con : Aloe , Lyc , Nux-v , Sars .
DD	Eliminatori maleodoranti (LUES) in ordine di gravità dell'odore: Berb < Nitr-ac < Benz-ac (acido Ippurico), anche Kreos organi genitali femminili con perdite maleodoranti, anche Thuja agli inguini.
AGISCE	Azione acuta (<u>d'elezione per la colica renale sn</u>) – per la colica renale <u>dx</u> di elezione è Lyc) e cronica. Agisce sull'acido urico e sull'acido ossalico. Anticolesterol. Normalizza bile e urine (Lyc). Quindi azione anti-gottosa (anche con uricemia normale) perché agisce sugli urati e sugli ossalati (anche Ox-ac agisce anche sugli ossalati e sugli acidi urici). Cura gli interventi (soppressione) di fistola anale.
EVOLUZIONE	Problema degli emuntori <u>epatico</u> e <u>renale</u> , a 2 passi dalla gotta. Poi GOTTA del ginocchio e dell'alluce.
MENTALE	Calo della memoria (perde il filo), Depressione. Apatia. Peggioramento al crepuscolo (Ars e Caust) ed appena alzato (SIC).
MODALITÀ	
<u>Aggravamenti:</u>	Con la pressione. Al mattino (SIC). Con il <u>ciclo mestruale</u> .
<u>Alternanze:</u>	Alternanza di disturbi polmonari e urinari.
<u>Lateralità</u>	<u>sn</u>
SINTOMI GENERALI	Sensazione di freddo localizzato, specie organi periferici e declivi (stasi), piccolo bacino, <u>elezione lombalgia sn</u> (come Bry). Anemia degli artritici. Bulimia. Sonnolenza post-prandiale (Lyc). <u>Prurito</u> anale ed alla piega del gomito.
<u>fase acuta</u>	<u>Coliche biliari</u> sia litiasiche che alitiasiche. Colica biliare con dolori subito intensissimi. Peggio con la pressione e con il movimento. <u>Colica renale</u> (dolore crampoide che s'irradia in basso lungo l'uretere fino allo scroto, alle cosce). <u>D'elezione per la colica renale sn</u> (Lyc : di elezione per la colica renale <u>dx</u>).
	<u>Dolore acuto</u> con irradiazione al punto cistico. Epigastrico. Dolore in sede cistica che s'irradia all'epigastrio al lobo sn del fegato. Dolore lombare. Dolori reumatici migranti.
<u>fase cronica</u>	<u>Drenante renale</u> (Sars), <u>biliare ed epatico</u> . Non ha effetto a lungo termine: 15 CH per 1 mese. Dolore epigastrico. Macchie rosso-bluastrae alle commissure labiali. Iperuricemia. Iperbilirubinemia. Dolore in sede cistica che s'irradia all'epigastrio al lobo <u>sn</u> del fegato. Dolore lombare.
SINTOMI LOCALI	
<u>Gotta:</u>	Soggetti con precedenti di litiasi renale. Dolore a barra (cintura). Rischia la colica renale. Preventivo della colica renale: Coloc e Bell . Berb in genere a <u>basse diluizioni</u> per favorire l'aumento della funzionalità renale. In genere con Pareir .
<u>Testa:</u>	Cefalea, vertigini, iriti (autoimmuni), congiuntiviti.
<u>Naso:</u>	Naso rosso degli intossicati, gotta, accumulo di scorie (Psor , Sulph , [piccoli farmaci drenanti: Berb , Led , Sars]). Rinite specie mattutina (artritica) (SIC) (frequente negli acidi).
<u>Cute:</u>	<u>Di elezione per le dermatiti cercinate</u> , pigmentazioni cutanee. Dermatosi eritemato-squamosa di forma rotonda (mummulare) con tendenza a guarire dal centro (aspetto cercinato). Prevenzione dei foruncoli (Berb , Sil , Calc-s).

<u>Digerente:</u>	Afte, colelitiasi, <u>colica biliare</u> con dolori subito intensissimi, ittero, emorroidi, diarrea giallastra (Podo). Ragadi anali, con eczema perianale, dolori trafittivi. Disturbi urinari. Fistola anale (aiuta cicatrizzazione), dispepsia, dolori brucianti dopo la defecazione, si irradiano all'ano, bruciore anale (Sulph). Cura le soppressioni di fistola anale.
<u>Circolatorio:</u>	Bradycardia, extrasistoli, coronaropatie arteriosclerotica da patologie dismetaboliche Diabete e Gotta (Lyc , Nux-v → Sulph , Colch , Arn , Berb), varici, ipertensione.
<u>Genito-urinario:</u>	CRUCIALE. <u>Colica renale</u> specie a sn , cistite acuta, cronica e ricorrente (micosi). Uretrite, vaginite, poliuria, dismenorrea. Urine con deposito rossastro. Nefropatie/acute. Sensazione di bruciore e ribollimento nella regione renale, edemi, urina bruciante con sedimento rosso mattone o bianco-grigiastro.
<u>Reumatologia:</u>	<u>Patologia articolare acuta:</u> Artrite reumatoide. Artrite settica. Artrite gottosa. Febbre reumatica. Berb : 90% dipende dal metabolismo, 10% da artriti a cavallo tra acuta e cronica. <u>Dolori reumatici migranti</u> [Benz-ac (PSO), Puls (SIC), Kali-bi (LUES), Kalm (paralitici), Colch], a fitta da un'articolazione all'altra. Dolore come se un chiodo fosse conficcato nell'articolazione. Lombalgie e mialgie aggravamento con il movimento e gotta (PSO).
<u>Locomotore:</u>	Dolori (dovuti alle scorie) vaganti urenti come spilli, irradianti, <u>lombalgia</u> . Dolori che peggiorano alzandosi da seduto, dolori pelvici. Questi dolori pungenti secondo la dottrina delle signature sarebbe da riferire all'arbusto spinoso.

SINTESI CLINICA

CARB-SULF/SIC-LUES-PSO. Lombalgia. Gotta. Sovraccarico renale. Drenante renale, epatico cutaneo.
Coliche renali sia litiasiche che alitiasiche. D'elezione per la colica renale **sn**. Di elezione per le dermatiti circinate. Dolori reumatologici migranti.

TERAPIA

Berb in genere a basse diluizioni per favorire l'aumento della funzionalità renale e con **Pareir**.