

CACTUS CACTI

(Cact-c)

MODALITÀ Sensazione di compressione (**Cact-c**, **Natr-m**).
Aggravamento: Salendo.
Desideri: Tabacco con turbe cardiache: **Cact-c** (angina), **Spig** (extrasistoli), **Tab**, **Calad**.
Stare all'aria aperta.

Riposo/Posiz:

- <: Decubito sul fianco sn

Movimento:

- <: Salendo, camminando in salita, salendo le scale (**Cact-c**, **Lyc**, **Spong**, **Sulph-ac**).

SINTOMI GENERALI Cefalea con dolore pressante al vertice che migliora con la pressione.
Emorragie di sangue nero che coagulano facilmente.

SINTOMI LOCALI

Cardiologia: Scompenso cardiaco e crisi anginosa da sforzo (Acon). Tachicardie violente dolorose irregolari con SENSAZ DI COSTRIZIONE TORACICA COME SE IL TORACE FOSSE COSTRETTO DA CATENE, senso di oppressione e soffocamento con INTORPIDIMENTO O DOLORI ed edema del braccio e della mano sn. Non può stare sdraiato deve sempre avere la testa alta nel letto. Angina, cardiomiopatia, infarto, pericardite, gravi crisi d'asma, nevriti. I dolori sono CATTIVI, VIOLENTI, FORTI.
Corrisponde alle affezioni dolorose del cuore secondarie a reumatismo (**Colch** e **Kalm**) o secondarie a disturbi gastrici dolorosi (**Crat**) o ipertrofie che appaiono bruscamente dopo uno sforzo fisico intempestivo o prolungato (**Arn**, **Rhus-t**).
Angor. Dolore precordiale costrittivo, irradiato al braccio sn con intorpidimento, al collo, all'orecchio sn, edema della mano sn. Angor da sforzo (**Cact-c**, **Acon**). Oppressione toracica, cefalica. Costrizione in varie regioni del corpo.
Ipertensione in soggetti cardiopatici con crisi anginose. Sensazione di costrizione al cuore come per una morsa. Sensazione di violento afflusso di sangue al torace. Ipertensione con marcato calore alla testa.

IPERTENSIONE ARTERIOSA

Ipertensione può essere SIC o LUES

L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES.

Ipertensione LUES : **Sulph**, **Acon**, **Ars**, **Nux-v**, **Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**, **Lyc**

Per il LUES complementare profondo di **Rhus-t** è **Aur**, mentre per la SIC è **Natr-s**

Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare

Ginecologia: Periodi mestruali dolorosi: Crampi estremamente dolorosi. I crampi si sentono come se vi fosse una stretta banda intorno l'addome. In alcuni casi, la paziente piangerà dal dolore. Il flusso tende ad essere coagulato con dolore al passaggio di ogni coagulo. Ci possono essere anche dolore lancinante nei pressi dell'ovaio.

SINTESI CLINICA

Scompenso cardiaco e crisi anginosa da sforzo con dolore precordiale costrittivo, Ipertensione in soggetti cardiopatici.

Periodi mestruali con crampi estremamente dolorosi

Cefalea con dolore al vertice che migliora con la pressione.

Emorragie di sangue nero che coagulano facilmente.