

CALCAREA FLUORICA

(Calc-f)

Nosode della costituzione FLUORICA

Calcarea: indolenza, Lassità legamentosa e vene ectasiche.

Il Fluoruro di Ca si trova nel SN, ossa, smalto dei denti, unghie, sangue, latte, fibre elastiche (anche **Sep** e **Fl-ac**).

KN :

Il LUES di Calc-f si esprime con il disordine.

Disordinato	Calc-f e Merc (distruttivi). Phos (caotico senza saperlo), Phos-ac , Sulph
--------------------	--

COSTITUZIONE FLUOR, Pluricostituzionale ad azione lenta (somministrazione prolungata).

DIATESI LUES (**Fl-ac** è più LUES).

FISIOLOGIA

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo					maiale	
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, disturbi toracici, cicatrici						
		+ LUES Lach								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c						
				Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (***) (°) da risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac	
									Cheloidi Graph	
				Sclerosi		Sep ama l'aceto				
						Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi				
						TR				
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva				Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja	
				SULF	Desiderio di ben apparire					
MUR						Fibromini				
FOSE				Thuja magra	SIC Non imbibita					
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***) (°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSE							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (***) (°)							
			II°istanza		SIC, psoriasi dure	Tios				
		TUB-SIC	Guaj							

			Carb-v BPCO
	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy
			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)
			Baryta-i
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>		Baryta-m
			Acon
		+ PSO, TUB, SIC	Ars
		+ PSO	Aur manager scaricato, pensionato
			Plb neurologico
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB
			Baryta ebete
(°)	Eliminatori di scorie SIC	Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls	
Lipomi	Complementari nei lipomi Sil , Stann . Anche Thuja e Carc .		
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir
Caust + Natr-s	Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars
Caust	Peggioramento →		Plb
Zinc + Plb	Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Sil (che è complementare anche di **Fl-ac**)/ ---

COMPARARE

con **Con, Lap-a, Bar-m, Hecla, Rhus-t**

DD

- **Calc-f** paura immotivata della povertà, mentre **Gels** paura concreta.
- **Calc** artrosi non grave.
- **Kali-bi**: dolori reumatici migranti.

AGISCE

Sulle fibre elastiche e sui legamenti

MENTALE

Soggetto instabile, ansioso e avaro (ha paura per i suoi soldi), indeciso (sempre in bilico tra due decisioni).

fase stenica

Capace, intuitivo. Ha un carattere tenace e metodico ed uno spirito positivo. Temperamento calmo, pigro, facile ad adattarsi e pratico, ma esagera spesso le proprie preoccupazioni diventando facilmente scoraggiato e pessimista.

fase astenica:

Disordinato, indisciplinato, ansia per la salute, indecisione marcata. Sofferenze aggravate pensando.

Avarizia, paura di catastrofe economica, paura immotivata della povertà (**Calc-f, Fl-ac, Bry, Psor, Sep, Calc, Veratr**), sogni di miseria (Denaro in banca. Paura del buio. Insonnia (LUES). Ansia, depressione, attacchi di panico.

Bambini
Agitati, eccitati. Soffrono di dolori, detti di crescita, di <u>mal di testa, non appena fissano l'attenzione su un libro</u> . Bambini magri che sono cresciuti troppo in fretta e che stanno male.

DETERIORAMENTO CEREBRALE. Lentezza nel comprendere perché pensa a molte cose (**R51**). **Dislessia** (**Baryta, Natr-m, Sil, Calc-f, Zinc, Phos-ac, Agar**).

MODALITÀ

Lingua secca con sete scarsa (**Gels**).

Bambini
Si svegliano di notte gridando in preda a sogni spaventosi.

Aggravamenti

- Freddo locale, correnti d'aria, umidità, calore generale, notte (LUES) anche non stando a letto.

UMIDO	
< con i cambiamenti di tempo	Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang-met, Natr-s, Nitr-ac, Nux-v, Petr, Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor, Puls, Rhod, Sep, Sil.
< con il clima umido	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.

Farmaci anti-SIC	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,
	Thuja < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
	E anche : Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Ruta, Sep.

- Tutte le sofferenze sono aggravate pensandoci,

Miglioramenti: Caldo, dolori che migliorano con il caldo, bevande calde, applicazioni calde, aria fresca.

Lateralità **sn**

Avversioni: Uova, alcool.

Desideri: Cibi dolci (zucchero) e cibi salati (come **Arg-n**), cibi acidi (sottaceti).

Riposo/Posiz: <: riposo

Movimento:

- <: All'inizio del movimento.
- >: Dolori cronici che migliorano con il movimento lento e continuo. **Calc-f, Dulc** (SIC), **Rhod** (SIC), **Ruta** (periostio).

SINTOMI GENERALI

Longilineo disarmonico insicuro, privo di fascino ed eleganza. Agitazione. Tremori. Dimagrimento.

Bambini
Anemici. Disturbi della crescita con emaciamento e debolezza nervosa. Soffrono di dolori, detti di crescita, <u>sviluppo scheletrico non armonico</u> (asimmetrie), ossa gracili, ipercalcificazioni con esostosi e osteofiti, fragilità delle unghie. Volta palatina ogivale (LUES), Caduta di capelli. Varici dolorose. Bambini magri che sono cresciuti troppo in fretta e che stanno male.

Dentizione irregolare con tendenza alle carie, denti accavallati (LUES) (**Calc, Calc-f, Calc-p, Sil**). Mobilità dei denti con o senza dolore (**Sep** e **Natr-c**: aftosi, i denti cadono con poca flogosi). Paraodontopatie (gengiviti, piorrea **Arg-n**).

Tendenza all'indurimento degli organi, sclerosi (**Baryta**), alla formazione di fibromi duri, adenomi, tumori nodulari, apparato genitale, cicatrici indurite (**Fl-ac**) (cicatrici cheloidi **Graph**).

Tendenza alla lassità dei tessuti con aracnodattilia, ptosi degli organi, ernie. Tendenza alle aderenze dopo intervento chirurgico.

Magrezze: Ipertrofia tiroidea ectasie venose (teleangectasie del volto).

Ustioni da raggi X.

SINTOMI LOCALI

Cute:

Secca, screpolata, nodosità dure, spesso bianchissima. Ectasie venose molto appariscenti su pelle bianca come alabastro. Lipomi, cisti, Eissurazioni del palmo delle mani e della pianta dei piedi. Tendenza alle cicatrici cheloidi. Insieme a **Fl-ac** agisce sulle cicatrici indurite (mentre **Graph** agisce sulle cicatrici cheloidi). I farmaci SIC agiscono su unghie, capelli e pelle, ustioni da raggi X. Mentre quelli LUES sulle smagliature:

I farmaci SIC agiscono su cute, unghie e capelli			
Smagliature (LUES)	Il principale: Sep	Confuso sbarellato: Calc-f	Libertino: Fl-ac

Ulcere (ictus per soppressioni di ulcere) :

- non dolenti: **Con**
- con bordi rilevati: **Graph**
- tessuti molli con bordi rilevati: **Nitr-ac**
- con lipomi, cisti ai margini: **Calc-f**
- tessuti duri: **Fl-ac**

Oculistica:

CALAZIO: Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio. Torpido, quindi più TUB.

Endocrinologia:

Rilassamento mammario notevole (alterazione del tessuto elastico). Nodosità dure in un seno con marcato reticolo venoso senza cianosi.

Ipertiroidismo. (**Iod, Lycps, Iodio + R1** più veloce normalizzazione degli anticorpi). Ipertrofia tiroidea in soggetto con disturbi circolatori, ECTASIE VENOSE, agitazione, tachicardia, tremori, dimagrimento. Eco-tiroidea di controllo. Gozzo tiroideo. La tiroide è un punto **TUB**

Diabete con perdita dell'appetito, dimagrimento. Agitazione, polluzioni, sovente leggera eccitazione sessuale, Sudori alla testa ed al collo.

Respiratorio:

Molto resistenti alla tbc. Catarro giallo-verdastro di cattivo odore. Tosse con solletico in gola. Bronchiectasie (**Sep, Calc-f**).

ORL:

Adenoidi. Suppurazione cronica dell'orecchio medio.

Digerente:

Protrusione del mascellare (sup), asimmetria del volto e della testa. Denti fragili, smalto nerastro, carie precoci (**LUES**). Dolore epicondrio (??) (ipocondrio ?) **dx** (**LUES**) per ptosi gastrica. emorroidi costituzionali, prurito anale. Ernie congenite.

Cardiocircolatorio:

LUES agisce sulla parete del vaso (**Calc-f, Fl-ac**).

Farmaci vascolari LUES: **Acon, Ars, Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**

Problemi di circolo venoso sono TUB o LUES, capillari più TUB

Debolezza del tessuto connettivo con varici, dilatazioni capillari e venulari, ectasie vascolari e fragilità delle fibre elastiche con facoltà di tendere troppo le piccole articolazioni.

VARICI VENOSE/RUGHE	
TUB (Sep)	LUES (Calc-f, Fl-ac)
Stasi venosa	Sfiancamento del tessuto elastico
Varicocele sn (stasi venosa): TUB	Sep ha una componente LUES: sfiancamento del tessuto elastico
↓	↓
VARICI VENOSE	

Ipertensione.

Infarto al 3° mese **Calc-f** fa cicatrizzare la necrosi.

Aneurismi.

Angiomi da Tumori delle pareti dei vasi (gli angiomi sono fegato).

Flebiti dure (colpisce le vene un poco di più delle arterie) Varici costituzionali.

Ulcere varicose. Ectasie venose, anche fistole. Emorroidi nei giovani.

Linfatico:

Linfonodi ipertrofici e induriti. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali. Adenoidi (**Calc-f**-osso-, **Agra**-a bassa diluizione-, **Baryte, Iod**).

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI					
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.					
TUB					LUES
↓					↓
Calc-p					Baryta
↓					↓
Calc-i					Bar-i
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros
Ars					↓
↓	↘			↙	Iod
Marm TK			↘	↙	Lues
				Ars-i TUB-LUES caloroso	
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod			
Adenoidi Quando c'è edema		Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari		LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn		Sulph-ac			

Muscolo-scheletrico: **Ossa** poco calcificate (osteoporosi - **Calc**, **Calc-p**, **Calc-f**, **Sil**) o esostosi diffusa e osteofiti. Manifestazioni distruttive e deformanti (osteofiti - **Calc-f**). Grandi articolazioni. Brutte esostosi, calcificazioni anomale, curvature anomale della colonna. Caratteristico ispessimento del femore nei bambini rachitici. Dolori reumatici migranti (**Kali-bi**). **Reumatismo** → anchilosi (TUB, SIC), iperproduzione ossea (LUES). Anchilosi sclerosi d'organo di tipo LUES (**Baryta**). Cisti sinoviali. Lassità delle articolazioni e dei legamenti.

Reumatismo articolare cronico deformante del SULF: Rhus-t → TR → Denys → TK (TUTTO TUB !!!)		
LUES	Rimedio minerale di fondo. Cisti tendinee. Lombalgie croniche. tendenza alle deformazioni articolari.	Calc-f

Artrosi grave. Artrosi coxo-femorale (LUES-SIC) (**Stram dx**, **Calc-f**, **Hyosc dx**, **Natr-s sn**). Lombalgie croniche. Idrartrosi a ripetizione.

Artrosi + demineralizzaz
Calc → Calc-f → Calc-p

Spondilite anchilosante:

SPONDILITE ANCHILOSANTE		
Ha sempre una forte componente TUB, poi c'è anche una componente LUES e SIC		
Rimedi ad azione locale		
Rigidità mattutina che migliora con il movimento		Rhus-t
Infiammaz con turgore dei tessuti superficiali (dato non sempre rilevabile, anche senza di esso Apis è comunque indicato)		Apis
Sensaz di debolezza nella regione lombare (come Kali-c). Anche <u>ex radiazione</u> .		Rad-br
SIC. < nettamente con il tempo o ambiente umido. Deve essere infiltrato. Cambia umore in presenza di umidità.		Dulc
In omeopatia è il farmaco <u>anatomopatologicamente indicato</u> per la spondilartrite in quanto farmaco di fibrosi dei legamenti e dei tessuti periarticolari . Lassità legamentosa. Esostosi diffusa.		Calc-f
Rimedi cronici di terreno		
SIC		Thuja
	Cute oleosa. Dermatite seborroica. Ingrassato dopo trauma.	Natr-s
	Precedenti blenorragici.	Med
PSO		Sulph, Sulph-i
TUB	Fenomeni fibrosi. 1 anno di terapia	T.R.

Urogenitale: **Fibromi** uterini (grandi e duri), fibromatosi uterina. Prolasso dell'utero. Menopausa con osteoporosi (**Calc**, **Calc-f**, **Calc-p** -LUES-, **Sil**, **R34** (rimineralizzazione). Mastopatia fibrocistica, mestruazioni abbondanti. Ptosi renale.

Oncologia: Adenocarcinoma della mammella: Notevole rilassamento mammario (alteraz del tessuto elastico). Nodosità dure in un seno con marcato reticolo venoso senza cianosi. Dolori meglio col caldo.
Prevenzione : (**Thuja**, **DNA** (Immunoterapia omeopatica), **Carc**, **Calc**, **Lyc**, **Sulph**, **Med**, **Sil**, **Ars**, **Lues**).

SINTESI CLINICA

Pluricostituzionale ad azione lenta. Diatesi LUES + SIC sclerotica. Il LUES di **Calc-f** si esprime con il disordine. Soggetto instabile, ansioso e avaro (ha paura per i suoi soldi), indeciso (sempre in bilico tra due decisioni). Prima capace, intuitivo, tenace e metodico. Poi disordinato, indisciplinato, ansia per la salute, indecisione marcata. Avarizia (paura immotivata della povertà).

Aggrava con il freddo, migliora con il caldo. Avversione per uova ed alcool, desidera cibi dolci (zucchero) e cibi salati e cibi acidi (sottaceti).

Longilineo disarmonico insicuro, privo di fascino ed eleganza. Dentizione irregolare, Tendenza alla sclerosi, all'esostosi ed alla lassità legamentosa (aracnodattilia). Fibrosi, artrosi grave, spondilite anchilosante. Gozzo tiroideo.

PATOLOGIE

Aneurismi. Angiomi. Arteriosclerosi. Cataratta. Distrofie ossee. Emorroidi. Fibromi. Fibrosi dei testicoli e delle ovaie. Gozzo. Indurimento della lingua. Otosclerosi. Periostiti croniche. Ptosi gastrica, renale, uterina. Ragadi anali. Reumatismi. Sclerodermia. Tendenza alle storte. Tumori ossei. Ulcere varicose. Varici.

PUNTO DI WEIHE Sulla linea ascellare mediana a sn, all'altezza del terzo piano intercostale

TERAPIA/DOSE Prevenzione delle aderenze (cui tende) dopo intervento chirurgico.