

CAMPHORA OFFICINALIS

(Camph)

Camph, **Veratr**, **Cocc** sono farmaci da Pronto Soccorso. Il rimedio è anche un analettico bulbare.

KN : I dolori sono calmati dal calore, ma il paziente preferisce stare al freddo.

[**Puls, Sil, Aesc** i dolori superficiali sono calmati dal calore e quelli profondi dal freddo]

FISIOLOGIA Stato di shock con freddo e prostrazione, anche post-intervento. Somministrazioni ravvicinate e continue per qualche giorno

COMPLEMENTARE/SINERGICO Canth.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Op, Phos.**

COMPARARE con : **Carb-v, Cupr, Ars, Veratr.**

DD

Dolori		
I dolori superficiali sono calmati dal calore	Puls, Sil, Camph	Aesc
I dolori profondi sono calmati dal freddo		
I dolori sono calmati dal calore, ma il paziente preferisce stare al freddo		

AGISCE

Sfera d'azione su PLETORA DA STASI VENOSA, anche su arteriti, stati di raffreddamento, collassi, polluzioni notturne.

MENTALE

Ansia, timore degli altri, paura dell'oscurità, tendenza al collasso, sensazione di morte imminente, alterazioni del desiderio sessuale (aumentato o scomparso). Il soggetto vede fantasmi e figure immaginarie.

MODALITÀ

Aggravamenti: Con il freddo, ma non si copre.

Miglioramenti: Con il caldo. Bevande fredde (sete di). Pensando al proprio male

Avversioni: Intolleranza al latte molto LUES stati coleriformi e tifoidi.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)					
Patologie più gravi scendendo verso il basso					
SULF/MUR – TUB					SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastro. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea
		Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc			
↓					↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree			Mag-c
					Ant-c Fegato sovraccaricato
↓					↓
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔		Natr-c
Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
Sintomatici colecisti/fegato					
Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
↓				↓	
LUES. Punto chiave neonato/bambino					
AETH					
Intolleranza totale al latte					
Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente.					
Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).					
↓					

Componente esagerata LUES	Ars	Stato Coleriforme e Tifoide
	Bapt	
	Veratr	
	Camph	
	Cupr	
AA aggiungono		
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.	
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.	
All-s, , Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy		

SINTOMI GENERALI

Shock, collasso, precoma, Stasi venosa.

Ha volto pallido e angosciato, ha freddo esagerato.

Lingua :

Lingua	
Fredda, tremolante, bluastra, con alito freddo	Camph
Pallida e fredda	Cupr, Veratr
Paura al calar del sole, la notte al buio	Caust
Pallida biancastra	Kreos

Cute fredda e ciò nonostante si scopre e rifiuta le coperte.

In presenza di febbre o dolori addominali, il soggetto si copre, ma una volta passati (sia febbre sia dolori), la cute diventa fredda e si scopre: Camph

Colpo di calore : reagisce al calore tanto da sentire freddo intenso con tremori. Debole con vertigini. Potrebbero essere presenti crampi muscolari alle braccia, gambe, addome.

Vaccinazioni

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI	
http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html	
Dopo vaccinazione <u>anti-morbillo-parotite-rosolia</u> . Se debolezza circolatoria	Camph

SINTOMI LOCALI

Infettivologia: Raffreddore : In generale Acon, Camph, Nux-v.

<u>Febbre</u>	Africana	Ter
	Gialla	Ars, Crot-h, Phos
		Act-r
	Intermittente (vedi Malaria)	
	Reumatica o reumatismo acuto	Acon, Dulc, Sulph
	Ricadute febbrili	Camph, Nux-v (Ruddock)

Eresipela : Graph 30 CH + Camph ogni 15 min

Colera
Rubini : 5 gtt di estratto alcolico di <u>Camph</u> prese 3 o 4 volte al giorno costituiscono una prevenzione contro il Colera
Clarke : Una goccia di <u>Cupr-act</u> x 3 dovrebbe essere data sera e mattina in un po' d'acqua. + <u>Camph</u> . Ruddock
<u>Ars, Cupr-act, Sulph</u>
Hahnemann e al. : <u>Camph</u> , Cupr, Veratr
<u>Ars, Cupr-act, Veratr</u> + <u>Camph</u> 200 CH o <u>Lach</u> 200 CH o <u>Sulph</u> 200 CH, 3 dosi/die
Herig: la migliore prevenzione dal colera è senza dubbio <u>Sulph</u> , la 1-6 CH possono essere usate 2 volte al dì
Richard Epp afferma che i principali rimedi preventivi sono <u>Cupr</u> e <u>Veratr</u> somministrati alternativamente, uno al giorno; una goccia della tintura madre in un cucchiaino d'acqua bollita e raffreddata ogni mattino e sera. <u>Cupr</u> è stato raccomandato per l'uso preventivo da molti altri autori. Jousset riferisce la sua esperienza, analoga a quella del dott. Mailhet in Giappone, secondo la quale durante un'epidemia di Colera le persone a cui erano state fatte indossare piastre di rame erano sfuggite all'infezione.

Digerente:

Vomito
Vomito e scarica intestinale con cute fredda, livida, secca
Camph

Urologia: Nefrite, glomerulonefrite: Apis, Ars, Calc-a, Camph, Colch, Lach, Med, Natr-m, Stront, Ter

SINTESI CLINICA

Stato di shock con freddo e prostrazione, anche post-intervento. Somministrazioni ravvicinate e continuate per qualche giorno. Lingua fredda, tremolante, bluastra, con alito freddo.

Dolori sono calmati dal calore, ma il paziente preferisce il freddo. In presenza di febbre o dolori addominali, il soggetto si copre, ma una volta passati (sia febbre sia dolori), la cute diventa fredda e si scopre.