

CAPSICUM ANNUUM

(Caps)

KN :	SETE – BRIVIDO – FEBBRE come Malaria, Brucellosi
COSTITUZIONE	CARB (principale)-SULF. Pletorica, carnagione chiara con grasso flaccido freddo con reticolo venoso, guance rosse ma fredde al tatto (falsa pletora), muscolatura rilassata.
DIATESI	PSO-SIC-LUES
FISIOLOGIA	farmaco dei BRUCIORI del CARB.
INCOMPATIBILE/ANTITODO	--- / Cina, Calad
COMPARARE	con : Puls, Lyc, Bell.
DD	Caps dopo defecazione: (1) dolore importante alla schiena e (2) sete eccessiva. Sintomi respiratori compaiono più rapidamente di Ferr-p.
AGISCE	Farmaco di sclerosi epatica e renale
EVOLUZIONE	Caps sta tra Calc e Baryta .
MENTALE	Testardi. Nostalgia, vive nel passato. Ipersensibilità: passano dalla giovialità alla rabbia per un nonnulla. Diffidenti perché deboli.
MODALITÀ	Forte <u>sete</u> dopo dissenteria. Mentre bevono acqua ghiacciata (come Phos) hanno un brivido: sete → brivido → febbre (come Chin per la malaria e la brucellosi).
<u>Aggravamenti:</u>	Freddo. Alcolici.
<u>Miglioramenti:</u>	Caldo, bevande calde. Mangiando.

SINTOMI GENERALI

- Debitati ↔ Intossicati (birra, alcol, ecc..) o figli di intossicati. Anziani debilitati da lunga malattia cui hanno reagito male. Ulcera gastrica. Convalescenti. Alcolisti (**Ars, Nux-v**). Individui che hanno esaurito la loro vitalità. (Rivitalizzanti: **Psor, Sulph, Calc, Caust, Caps**).
- Dolori ardenti (**Bell, Caps**) come il peperoncino (mucosa infiammata) e quasi sempre accompagnati da brividi (occhi, orecchie, lingua, gola, stomaco, uretra, vagina, prostata, ano). Bruciori dei CARB **Caps**.
- Sensazione di costrizione in varie parti (gola, torace, vescica, retto).
- Forte sete dopo dissenteria → beve acqua ghiacciata (FOSF) → che fa male e ha brividi e sente freddo mentre beve.
- Febbri intermittenti.
- Ascessi

Ascessi (Sulph è sempre centrifugo)	
Secondo periodo : periodo di stato	
Ascessi <u>mastoidei</u> , ascessi <u>polmonari</u> . Caps si usa sempre in II° istanza, in I° istanza solo in caso di: - alcolisti o figli di; - ascessi della mastoide; - suppurazione <u>orecchio interno</u> (elettivo).	Caps (sete → brivido → febbre)- ome Chin per la Malaria e la Brucellosi

Ruta	Periostio
Arg-m	Cartilagini
Caps	Mastoide

SINTOMI LOCALI

<u>Febbre:</u>	Intermittente. <u>Sete</u> ed il bere causa brividi, quindi il paziente si fa l'idea che l'inizio del parossismo febbrile sia stato causato dalla prima bevuta.
<u>SNP:</u>	Sensazione come se la testa bruciasse. <u>Cefalea</u> ardente con febbre intermittente. peggiora muovendola, camminando, tossendo.
<u>Nevriti post-herpetiche</u>	

Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente/ recidivante → SIC	Hep 10 M/ Thuja
Nevrite post-herpetica	CARB	Caps
	SULF	Ars
	FOSF	Phos, Petr
	Moore	Vario

Orecchio:

ELETTIVO. Suppurazioni croniche interne dell'orecchio medio con perforazione del timpano e secernenti pus giallo denso, spesso associato a cefalea ardente, a brividi. Dolore alla pressione. Bruciori che migliorano con il caldo. Dolore che s'irradia alla mastoide. **Otite nel bambino: Mang o Caps.**

Mastoiditi ed ascessi mastoidei.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontro: Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chinin-s	
Catarrali	
Otite nel bambino. Bruciori che migliorano con il caldo. Dolore che s'irradia alla mastoide. Dolore alla pressione. Ulcera gastrica. Alcolismo.	Caps

Respiratorio:

Afonia. Raucedine dei cantanti, degli insegnanti, ecc...

Faringo-tonsilliti e faringiti croniche di alcolisti e fumatori. Dolori ardenti eccessivi (anche a causa del tabagismo).

FARINGO-TONSILLITI	
Blackwood : Baryta	
Angine rosse	
DOLORE ↓ CON BEVANDE FREDE E ↑ CON BEVANDE CALDE	
Sintomi più rapidi di Ferr-p. Bruciore con sensazione di costrizione spasmodica. Dolore alla deglutizione. Frequente coinvolgimento dell' <u>orecchio</u>	Caps peperoncino

Difterite grave con, oltre alla costrizione spasmodica, all'eccessivo bruciore ed ai brividi, gangrena della bocca e del faringe.

ELETTIVO negli **ascessi polmonari** e nella **gangrena polmonare**, quando l'alito non è cattivo, ma con la tosse vi è un odore putrido dai polmoni

Tosse violenta esplosiva, o a parossismi, procura cefalea ardente. Tosse con intenso dolore ardente al torace. Tosse accompagnata da dolori in parti distanti.

Digerente:

Dispepsie da fermentazioni anomale

LINGUA	
Anche da Micosi dell'apparato gastroenterico. R56 ottimo per verminosi croniche e recidivanti	
Dispepsie da fermentazioni anormale	Ant-c, Calc, Carbo-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph

Bruciori gastrici (dei CARB) con eruttazioni con piroso → iperalimentazione → **obesità**.

Obesità
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Magn-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

Sindrome metabolica

SINDROME METABOLICA --- SIC
R40 + R7 sono i composti principali per la sindrome metabolica
Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Calc, Caps, Graph, Kali-c, Lyc, Med (SIC in fase stenica), Natr-c, Thuja

Dissenteria

Emorroidi urenti come peperoncino. Feci ardenti con tenesmo rettale.

Urogenitale:

Cistiti acute, croniche o recidivanti Tenesmo, stranguria e sforzi, quasi sempre inefficaci, per urinare. Bruciore eccessivo. Cistalgie "*ad urine chiare*" psicosomatiche. Minzioni abbondanti, urine limpide, irritazioni vescicali con bruciore intenso.

Dolore alla **prostata** ardente e pungente durante o tra una minzione e l'altra. Gonorrea.

Impotenza con freddezza dello scroto e tendenza all'atrofia dei testicoli.

SINTESI CLINICA

CARB-SULF Pletorica, carnagione chiara con grasso flaccido freddo con reticolo venoso, guance rosse ma fredde al tatto (falsa pletora), muscolatura rilassata.

PSO-SIC-LUES. Farmaco dei BRUCIORI del CARB.

SETE – BRIVIDO – FEBBRE come Malaria, Brucellosi (forte sete dopo dissenteria, mentre bevono acqua ghiacciata hanno un brivido: sete → brivido → febbre).

Anziani debilitati, intossicati con dolori ardenti, urenti con febbre intermittente.

ELETTIVO. Nelle suppurazioni croniche interne dell'orecchio medio e negli ascessi polmonari e nella gangrena polmonare

TERAPIA/DOSE

Caps si usa sempre in II° istanza. In I° istanza solo in caso di: alcolisti o loro figli, ascessi della mastoide, suppurazione orecchio interno (elettivo)