

CARDUUS MARIANUS

(Card-m)

Epatici-biliari acuti e cronici

KN : **Macchie gialle epatiche sullo sterno anteriormente.**
COSTITUZIONE CARB-SULF
DIATESI SIC
FISIOLOGIA Farmaco della congestione portale con disturbi epatici: gusto amaro, lingua carica, inappetenza.

EPATOPATIE		
Rimedi epatici funzionali		
Nux-v, Natr-s, Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid		
Regolamentazione <u>neuro-viscerale</u> , ma NON funzione sull'epatocita (disintossicante dell'allopattia).		Nux-v
Insufficienza <u>funzionale</u> con fasi di eccitazione (S) e di rallentamento (Na)		Natr-s
Pluricostituzionale CARB-SULF. È più stenico e più SULF di Lyc . <u>Epatomegalia colestatica</u> . Maggiore azione sul lobo dx. Simile a Lyc . Dolori costanti sordi che si acutizzano periodicamente per distensione della glissoniana. Il dolore peggiora con la pressione e dal lobo <u>dx</u> si irradia all'angolo scapolare dx. Subittero. Feci ipocoliche mucose, iperbilirubinemia. Meglio bevendo acqua e latte caldo.	drenanti del parenchima epatico R7 15 gtt/die o 15 gtt x 2 o 2 cp/die	(Chel) si usa spesso insieme a Lyc
CARB-SULF/SIC. Pletorico. <u>Stasi venosa epatica</u> . Epatomegalia. Dolore evocato dalla palpazione peggiore al lobo <u>sn</u> . Epatopatie croniche. Cefalea. Nausea. Addome disteso. Stipsi. Feci dure nerastre. Emorroidi.		Card-m
Pluricostituzionale (CARB-SULF). Debilitazione. Diarrea, meteorismo. Abuso di farmaci allopatici. Iperestesia cutanea. Distensione addominale. <u>Flatulenza e meteorismo</u> . <u>Splenomegalia</u> senza epatite e senza malattie ematologiche.		Chin
Sindrome di Gitelman : Variante con <u>ipocalciuria</u> della sindrome di Batter (tubulopatia <u>autosomica recessiva</u> con <u>alcalosi ipokaliemica</u> , perdita di sali, <u>ipotesione</u> , ed <u>ipercalciuria</u>).		Prima Natr-m poi quando sta meglio Ars
<u>Lingua a carta geografica</u> (cattivo funzionamento epatico). Simile a Natr-m ed a Natr-s .		Tarax
Dolori agli angoli costo lombari		Solid
Ancora		
Agisce sull'epatocita e sulla colecisti		Puls
Insufficienza epatica costante (Na). Contiene S. Insufficienza con necrosi. Agisce sulla colecisti. Colecisti atonica.		Sep
Ha sintomi epatici quando giace sul lato sn		Mag-m
Aur, Calc, Carb-v		

COMPARARE con : **Chel, Chion, Merc, Podo, Bry, Aloe.**
AGISCE Drenante del parenchima epatico.

MODALITÀ

Miglioramenti: Sonno pomeridiano (**Lyc** riposo subito dopo pranzo, **Nux-v** riposo ½ ora dopo pranzo, **Card-m, Chel**). [Sonno pomeridiano peggiora **Staphy**].

SINTOMI GENERALI

Farmaco della congestione portale, da epatopatie acute e croniche [Rimedi epatici funzionali : **Nux-v, Natr-s, Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid**].

Quindi addome disteso, pletorico, congestionato con stasi venosa epatica, epatosplenomegalia e disturbi epatici: nausea, gusto amaro, lingua carica, inappetenza.

Emorroidi in epato-pazienti.

Dolore ipocondrio dx e, se evocato dalla palpazione, risulta peggiore al lobo sn.

Calcolosi biliare (preventivo **Card-m**):

Cal- coli	formazione dei	Frag
		Chin
		Card-m biliare

	renali	Lyc
	vescicali	Hydrang, Lyc

Stipsi, Feci nere, dure, in piccoli pezzi, difficili da espellere.

SINTOMI LOCALI

SNC: Cefalee con disturbi digestivi. Eemicranie biliari periodiche: cefalea congestizia periodica con sensazione di pesantezza al di sopra degli occhi e vomiti biliari.

Vascolare: Tendenza marcata alle varici e alle emorragie

Urologia: Preventivo nella formazione dei calcoli renali. Urine giallo oro.

SINTESI CLINICA CARB-SULF/SIC. Farmaco della congestione portale con disturbi epatici: gusto amaro, lingua carica, inappetenza. Stasi venosa epatica. Epatosplenomegalia. Epatopatie croniche. Drenante del parenchima epatico. Cefalee con disturbi digestivi. Migliora con il sonno pomeridiano

TERAPIA/DOSE Drenante il parenchima epatico **R7** 15 gtt/die o 15 gtt x 2 o 2 cp/die