

CHEIRANTHUS

(Cheir)

Odontoiatrico ed epatico

FISIOLOGIA

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES										
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m (°) herpes + SIC, Sep				
						+ LUES Nitr-ac				
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC grassa CARB-SULF	Calc, Kali-c, Graph							
			+ PSO	Ant-c (°) cefalee, obesità parte inf del corpo				maiale		
				Ant-t (°) obesità parte sup del corpo, di- sturbi toracici, cicatrici						
			+ LUES Lach							
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC imbibita , idroge- noide		Natr-s, Natr-c						
				Dulc (°) si da dopo per evitare la fase SIC. [+ Rhus-t (**) (°) da risultati meravigliosi, da settem- bre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med, Caust, Con, All-s						
				+ PSO profonda: Am-c						
				SIC + LUES: Staphy						
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto ela- stico						
Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche										
Cicatrici, Dolorose soprat- tutto all'aria fredda e con il tempo secco					Indurite Calc-f → Fl-ac					
Sclerosi					Cheloidi Graph					
					Sep ama l'aceto					
		Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi								
		TR								
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclero- tica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja			CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggra- vato e più LUES di Thuja		
				SULF	Desiderio di ben apparire					
				MUR	Fibromini					
				FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita				
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel car- pale (Dupuytren)	Rhus-t (**) (°) vescicole 5 CH							
			TR							
			Sil BPCO nei FOSF							
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t (**) (°)							
			II°istanza		SIC, psoriasi dure	Tios				
TUB- SIC	Guaj									
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO			Carb-v BPCO					
					Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy					
					Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)					
					Baryta-i					

	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>		Baryta-m	
			Acon	
		+ PSO, TUB, SIC	Ars	
		+ PSO	Aur manager scaricato, pensionato	
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB	Baryta ebete
(°)	Eliminatori di scorie SIC	Anche Mez croste, Canth grosse vescicole e Puls		
Lipomi	Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica		Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s	Peggioramento ➡	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust	Peggioramento ➡	Plb		
Zinc + Plb	Peggioramento ➡	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

EPATOPATIE		
<u>Rimedi epatici lesionali</u> I 7 farmaci per il fegato. Policresti. Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe		
Insufficienza funzionale legata a turbe endocrine. Aspetti <u>necrotici e lesionali</u> . ALT + AST ↑ (LUES).		Lach
Insufficienza <u>funzionale + lesionale</u> con interessamento del protoplasma e dei canali biliari. Steatosi → sclerosi. Anti-calcolo sulla composizione della bile, urine, sangue. Tutti i giovani operati di colecistectomia per calcoli sono Lyc . Antitumorale.	Farmaci gemelli risolvono al 90%	Lyc
Drenante pluricostituzionale CARB-SULF. È più stenico e più SULF di Lyc . <u>Epatomegalia colestatica</u> . Maggiore azione sul lobo dx. Simile a Lyc . Dolori costanti sordi che si acutizzano periodicamente per distensione della glissoniana. Il dolore peggiora con la pressione e dal lobo <u>dx</u> si irradia all'angolo scapolare dx. Subittero. Feci ipocoliche mucose, iperbilirubinemia. Meglio bevendo acqua e latte caldo.		Chel
Sindrome di Gilbert : patologia benigna del <u>fegato</u> che si manifesta con <u>iperbilirubinemia</u> , spesso nel secondo decennio di vita. Ne è affetto circa il 7-8% della popolazione adulta ed è a carattere ereditario, trasmessa con modalità sia autosomica recessiva che dominante.		90% Lyc o Chel (<u>specifico per neoplasia epatica in fase iniziale</u>).
Fase di pre-fibrosi dei parenchimi nobili: SN, rene, milza, pancreas (<u>diabete</u>) (Phos, Sep, Natr-m, Lyc, Calc-c, Carb-v), fegato. <u>Degenerazione grassa : fegato o remi</u> . Farmaco di elezione dell'epatite acuta. Epatopatie in fase acuta, con in genere tensione a <u>dx</u> , si usa a basso dosaggio (15 CH 1 volta/die) in tutte le costituzioni, anche come cura finale di <u>sclerosi</u> epatica (pre-cirrosi). Insufficienza epatica <u>lesionale</u> a carico della cellula, compreso il nucleo. Necrosi. Comunque se è FOSF va dato sempre, si alza a 200 CH solo nei pazienti Phos (rimedio d'organo). In tutti gli altri casi acuti a basso dosaggio. Nella epatite cronica solo per i FOSF.		Phos
SULF/PSO-LUES, funziona sulla motilità, cura le leucemie, e agisce anche sull'epatocita, nella sclerosi epatica (pre-cirrosi). <u>Epatiti croniche a tendenza cirrogena (LUES)</u> . Fibrosi come Plb .		Ars
Insufficienza funzionale. Sulph e Lyc : sono epatici e <u>psorici</u> . (se STEATOSI → SIC → Sulph non basta).		Sulph
Detesta gli altri. Cefalea frontale trasversale aggravata dal caldo e migliorata da applicazioni fredde. Rimedio epatico per eccellenza ma meno profondo di Sulph . Stasi venosa che provoca		Aloe

rigidità e rigonfiamento in tutto il corpo. Disturbo maggiore nelle <u>vene</u> del sistema portale. I sintomi venosi, gastrici e intestinali sono simili tra Aloe , Kali-bi , Sulph , Natr-s . Complementare per il fegato Sulph , anche Sul-ac , Kali-bi , Sep		
Anche		
Non è un policresto come i 7 farmaci per il fegato, ma agisce bene sul fegato. Principe per l'epatomegalia, la <u>steatosi</u> pre-cirrotica, la sclerosi epatica iniziale. Fase d'ingrossamento del fegato prima dell'ipertensione portale (cirrosi) bene per la steatosi (astenia).		Chion + Tio
Odontoiatrico ed epatico. Pre-cirrosi epatica		Cheir
<u>Lingua a carta geografica</u> (cattivo funzionamento epatico). Simile a Natr-m ed a Natr-s .		Tarax
Dolori agli angoli costo lombari		Solid
Agisce sull'epatocita e sulla colecisti		Puls
Insufficienza epatica costante (Na). Contiene S. Insufficienza con necrosi. Agisce sulla colecisti. Colecisti atonica.		Sep
Ha sintomi epatici quando giace sul lato sn		Mag-m
Aur, Natr-m, Calc, Carb-v, (Chin)		

SINTOMI GENERALI

DISTURBI DELLA DENTIZIONE		
Disodontiasi (difficoltà di eruzione) del III molare		
Stato congestizio in modo elettivo sull'angolo della mandibola. Naso tappato la notte a causa dell'irritazione di un dente del giudizio in eruzione. Può anche esservi una mucosa bucco-faringea congesta con segni di otite media.		Cheir 30 CH x 2
Se presente anche trisma		Cheir 200 CH