

CHINA OFFICINALIS
CHINA RUBRA o CHINA REGIA
(Chin)

Anti-astenico coincide maggiormente con un affaticamento prolungato o con gravi perdite di liquidi organici. Diarrea senza dolore. Anemia. Dispepsia (eruttazioni, pirosi, meteorismo). Bocca secca e amara sete di grandi quantità di acqua fredda, bevande fredde e acide (limonata), tutto è amaro

Borborighmi e meteorismo aggravati dopo mangiato più alla sera, con notevole sviluppo di gas nello stomaco e nell'intestino, non migliorato dalle eruttazioni e dalle flatulenze per il costante rinnovarsi

COSTITUZIONE CARB-SULF
DIATESI LUES-SIC
ETIOLOGIA Convalescenza e/o Perdita dei liquidi biologici, vomito, emorragia, allattamento prolungato, diarrea, leucorrea, perdita seminale, ascite (**Chin**, **Phos-ac**, **Natr-m**, **Kali-c**, **Stann**).
FISIOLOGIA Tossica sui protoplasmi meno differenziati, azione specifica sul plasmodio della malaria perché si concentra nei globuli rossi, e anche nel fegato, cervello, milza.
Diminuisce la coagulabilità nei provings, per cui si usa in caso di emorragie.
Inibisce la migrazione leucocitaria
COMPLEMENTARE/SINERGICO **Sulph**, **Ferr** e **Calc-p** nelle anemie, **Ars** nelle neoplasie.
INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Arn**, **Ars**, **Nux-v**, **Ip**.
COMPARARE con **Rad-br**, **Rhus-t**, **Ars**, **Natr-s**.
DD Va fatta con **Coloc** e **Mag-p**, anche **Chin** piegato in 2 durante le coliche (**Carb-v** meteorismo sovra-ombelicale, mentre **Lyc** obesità e meteorismo sotto-ombelicale).
AGISCE **Drenante del parenchima epatico**.
Come **Sulph** per l'azione sullo zolfo ematico intraglobulare.
A dosi deboli Azione eccitante sul SNC, sulle fibre muscolari lisce e striate.
A dosi elevate Depressione, astenia, scomparsa dei riflessi, vertigini, sordità (come gli acidi), emorragie, diarrea, reumatismo per deposito intra-articolare di metaboliti tossici.
Azione omeopatica È svolta dalla pianta nel suo insieme, azione sicuramente meno tossica dei suoi alcaloidi. Contrasta il desiderio insaziabile di alcol nei soggetti che tentano la disassuefazione.

EVOLUZIONE

In caso di uso di Acon	dopo l'attacco acuto	Sulph , Chin , Calc , Calc-p
	o in caso di ricaduta	il rimedio di base

MENTALE

- Idealista psichico e spirituale → disadattato **Chin**.

Grandi progetti NON realizzati	Sulph
Spirituale, sognante, va in India	Staphy
Grandi visioni di altri	Phos
Empatia, analisi, ingiustizia	Caust
- Paure :
 - Paura delle disgrazie **Chin**.
 - Paura degli animali (La paura degli animali è una componente TUB, mentre la paura dei ragni è una componente LUES) **Chin**, **Bell**, **TK**.
 - Paura dei cani **Chin**, **Calc** (cani neri), **TK**, **Bell**.
- Irritabile, reazione eccessiva, fino al delirio (delirio alcolico o dopo emorragie). **Asar**, **Cham**, **Coff**, **Chin**, **Ign**, **Nux-v**, **Puls**, **Teucr**, **Valer**.

MODALITÀ Debolezza, pallore, ipersensibilità, ronzi, vertigini, cefalea (perché agisce anche sugli organi di senso – occhi, orecchio, ...). Freddoloso.
Sete eccessiva di acqua fredda. **Forte sete dopo dissenteria, mentre bevono acqua ghiacciata (come Phos) hanno un brivido. [sete → brivido → febbre, come Chin per la malaria e la brucellosi].**

Aggravamenti: Freddo, urti, minimo contatto, movimento, sera e la notte, birra, dopo i pasti, frutta, pane, latte (intolleranza), **sensazione di pieno addome pelvi e ano** (**Chin**, Aesc, Lyc, Carb-v), assenza di fame.
Odore del tabacco, odori violenti. In autunno (**Chin**, Dulc, Merc, Rhus-t).

BORBORIGMI E METEORISMO	
< dopo mangiato più alla sera, con notevole sviluppo di gas nello stomaco e nell'intestino, non migliorato dalle eruttazioni e dalle flatulenze per il costante rinnovarsi	Chin

Assenza di fame	
Disgusto di cibo solo a sentine l'odore.	Sep, Colch
Rifiuta il cibo grossa astenia, adulto. Cancro. Mucositi. → Kali-bi	Hydr SIC/LUES
Bambini. Dopo perdite di liquidi	Chin
	Cina
Non mangiano ed amano il sale. Mangiano e non ingrassano. Non amano il cioccolato	Natr-m
Astenia. Postumi sempre sdraiato.	Mang

Miglioramenti: Calore, pressione forte, piegato in due durante le coliche (**Chin**, Coloc, Mag-p, Rheum, Thlasp).

Periodicità (caratteristica PSO): Ogni 2 giorni.

Presente nella malaria, anche in assenza di plasmodi e merozoiti, dove la periodicità febbrile continua a manifestarsi : febbre malarica: brivido interno. Tremore generalizzato di pomeriggio o sera seguito da un periodo di calore intenso nel quale il malato si scopre e non ha sete e un periodo di sudoraz abbondante e prostrante il paziente ha sete.

In tutte le patologie febbrili con carattere di intermittenza: influenza, suppuraz, tbc, reumatismi.

Alternanze: ---

Lateralità ---

Avversioni: Intolleranza al pane, al latte e alla frutta, alla carne, alla birra (diarrea).

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)					
Patologie più gravi scendendo verso il basso					
SULF/MUR – TUB					SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastro. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.
		Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc			
↓					↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree			Mag-c
					Ant-c Fegato sovraccaricato
↓					↓
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔		Natr-c
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	↔	Carb-v Eruttazioni che migliorano	↔	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi
	↓				↓
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH				←ℒ

	Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).		
		↓	
Componente esagerata LUES		Ars	Stato Coleriforme e Tifoide
		Bapt	
		Veratr	
		Camph	
		Cupr	
AA aggiungono			
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.		
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.		
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy			

Desideri: Acqua fredda, bevande fredde e acide (limonata), tè (che provoca SIC, **Chin**, Thuja).

SINTOMI GENERALI

fase stenica

Azione sul sangue. Periodicità. Utile per arrestare l'emorragia acuta di sangue scuro misto a coaguli (**Chin + Phos**). Epistassi abbondanti e frequenti la mattina alzandosi. Emottisi. Ematuria. Emorragia post-traumatica o post-operatoria. Porpora.

Mestruazioni anticipate abbondanti (**Sabin**). Emorragie post-partum (es.: ritenzione di placenta). Post interruzioni di gravidanza. Grande astenia negli stati post-emorragici dopo grosse perdite croniche con paz anemico, astenico, pallido, occhi cerchiati. Gravidanza tubarica.

Colica biliare (agisce direttamente sulle vie biliari con effetto anti-colesterinico e preventivo formazione dei calcoli).

Calcolosi renale. Preventivo formazione dei calcoli: **Frag, Chin, Card-m**.

Calcoli renali **Lyc**.

Calcoli vescicali **Lyc, Hydrang**

Perdite di liquidi organici prolungate: leucorree eccessive, vomiti ripetuti, spermatorree, diarree, enteriti croniche, allattamento prolungato, suppuraz di vecchia data, piaghe, sinusiti croniche, bronchiectasie, ascite, edema, anasarca: **Chin, Phos-ac, Natr-m, Kali-c, Stann**.

fase astenica

Volto pallido. Abulia, astenia, apaticità, melanconia, debolezza di vista, sindrome di Menière, sonnolenza diurna, lentezza di ideazione, depressione profonda fino al suicidio.

Angor complicato da colite sn.

Diabete come conseguenza di onanismo. **Chin**.

Pazienti che hanno provato molti farmaci: astenici, stanchi, esausti → **Chin**.

Astenia e stanchezza dopo intervento o dopo chemioterapia **Chin**.

Astenia da malattie esantematiche: **Chin** 5 CH 3 granuli x 3, **Sulph-i** 30 CH la sera

Stanchezza		
+ mentale (+ LUES)		+ muscolare
Con	inizia dal basso, sclerosi a placche	→ Chin astenia dopo patologie

SINTOMI LOCALI

Mal infettive

Malaria: **Natr-m, Ars, Chinin-s, Ter, Eup-per, Malar, Gels, Chin, Sulph**.

Ogni primavera con il clima freddo: **Aran**. Hering **Ars, Chin, Sulph**.

Iperexcitabilità, iperestesia (come **Cina**). Vertigini vascolari (ipossia) **Chin**.

Ipersensibilità del cuoio capelluto (non si pettinano).

Cefalea pulsante, martellante. Dolore nucale alla base della 7° cervicale e 1° dorsale.

SN:

Testa:

Epistassi (**Mill** poi **Chin**) abbondanti e frequenti la mattina alzandosi. Sangue scuro, misto a coaguli. Faccia pallida, astenia. Gravi perdite di liquidi (diarrea, vomito, allattamento, ascite). **Chin**.

<u>Ascessi</u> -- Secondo periodo : periodo di stato (Sulph è sempre centrifugo)	
Ascessi mastoidei , ascessi polmonari . Caps si usa sempre in II° istanza, in I° istanza solo in caso di: - alcolisti o figli di, - ascessi della mastoide, - suppurazione orecchio interno (elettivo)	Caps (sete → brivido → febbre) è come Chin per la Malaria e la Brucellosi

Occhi:

Fotofobia, pupille contratte. Movimenti oculari dolorosi. Senso di pressione sugli occhi.

Orecchie:

Ipersensibilità al rumore. Ronzii. Vertigini.

Acufeni vascolari con cefalea da scompenso idrosalino:

Bollitore sul fuoco **Chin**, **Kali-c**.

Ruggito **Chin**, **Lyc**.

Ronzio auricolare **Chin**.

Cute:

Epidermide cerea come tutti i TUB. **Chin** e **Ferr** con poco sottocutaneo, **Stann** forme di tbc ulcerativa, **Puls**.

Delicata: CARB **Bell**, **Psor**. FOSF **Phos**.

Ipersensibilità anche da sfioramento.

Respiratorio:

Soprattutto forme croniche: Ipersensibilità alle correnti d'aria.

Pneumopatie (anche acute) febbrili, tbc, bronchiti croniche, laringiti acute, bronchiectasie, broncorree croniche.

Digerente:

Alitosi di origine gastrointestinale (Fortakel, Porfakel) dopo perdita di liquidi o in convalescenza **Chin**.

Aerofagia. Eruttazioni numerose con estrema flatulenza (che non provocano giovamento) e contrazioni spasmodiche dell'esofago con sensazione di bolla che risale dal basso in alto **Asa-f**, **Chin**.

Bulimia, digestione lente, abbondante eruttazione, abuso di tè,

Intolleranza al latte con eruttazioni che non migliorano

<u>Allergia/Intolleranza alla Carne in generale</u>
Ars , Veratr , Carb-v
Bry in acuto prevalente
Calc , Puls , Graph , Lyc , Chin

Gastroenteriti acute isolate (poco vomito e molta diarrea). Diarrea indolore con gonfiore dell'intero addome. Flatulenza, timpanismo (**Lyc addome sup**, **Carb-v addome inf**), ipersensibilità al contatto ed allo sfioramento. Sensazione di lipotimia. Etiologia: dopo eccessi di frutta e latte. **Chin**.

Gastroenteriti convalescenza con astenia fisica, pallore, ipotensione in pazienti che hanno subito grandi perdite di liquidi organici **Chin**.

Celiachia anche in età adulta da stress emotivo **Chin**.

Malassorbimento intestinale magrezze con diarree prolungate e spossanti. **Diarrea indolore**, seguita da immediata debolezza per perdita di liquidi. Intenso meteorismo e flatulenza. Diarrea cronica dei bambini intolleranti al glutine o allergici. **Chin**. Diarree da micosi : **Aloe**, **Ant-c**, **Ars**, **Bis**, **Chin**, **Colch**, **Cupr**, **Ip**, **Mag-c**, **Veratr**. Diarrea da chemioterapici o da farmaci. **Chin**.

Coliche flatulente, addome disteso e dolente (gonfia), lunghi sforzi per espellere feci molli, totale inattività del retto, diarrea post-prandiale e notturna. Meteorismo che induce a fare un ecoaddome : **Graph**, **Chin**, **Carb-v**, **Lyc**. Colite cronica **sn** complicata da **angor** cardiaco: **Lyc**, **Chin**, **Kali-c**, **Nux-m**, **Carb-v**, **Tarax**.

Chron e Colite ulcerosa (vedi) con diarrea profusa → astenia.

Epatopatie azione specifica sul fegato e vie biliari, dolori ipocondrio dx, epatomegalia, debilitaz, subittero, discinesia delle vie biliari, urine scure. Preventivo della calcolosi biliare e renale. In caso di splenomegalia senza epatite e senza patologie ematologiche → **Chin**

Rimedi epatici lesionali

I 7 farmaci per il fegato. Policresti.

Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe

EPATOPATIE

Rimedi epatici funzionali

Nux-v, Natr-s, Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid

Feci. Sensazione di pieno (specialmente addome pelvi e ano): Aesc, Chin, Lyc, Carb-v. Lunghi sforzi per espellere feci molli. Gonfia x flatulenza, Totale inattività del retto, necessaria espulsione meccanica. Abbondante eruttazione, Emorragie, Perdite prolungate, Debole, Pallida

Diarrea indolore (perdita di liquidi) (antidiarroico **R4**) seguita da immediata debolezza. Intenso meteorismo e flatulenza. Diarrea cronica dei bambini intolleranti o allergici al GLUTINE.

Flatulenti. Tutto l'addome è molto dilatato ed estremamente sensibile al minimo contatto. Eruttazioni frequenti che non alleviano. Coliche flatulenti dopo aver mangiato frutta. Diarrea indolore con molto gas < di notte o immediatamente dopo i pasti seguita da grande debolezza. Emorragie

Aumento di peso – dimagrimento - flatulenza			
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Lyc, Psor
		Dal basso	Abrot
Parte sup del corpo	Ingrassa	Ant-t, Calc ipotiroidismo	
Addome sup	Ingrassa	Ant-t maiale della costituzione CARB (SIC)	
	Flatulenza, timpanismo	Chin, Carb-v	
Addome inf	Ingrassa	Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo	Chin, Lyc	

Muscoli e articolaz:

Mialgie aggravate dopo il pasto o con il movimento. SIC: Chin. Arti inferiori deboli e stanchi come dopo una lunga marcia.

Reumatologia:

Gonfiore, rossore, edema, ipersensibilità estrema al minimo sfioramento (come Bry che però migliora la notte). Anche le piccole articolazioni delle dita (anche AR).

Ginecologia:

Menorragie e metrorragie sangue color lavatura di carne o sangue scuro con coaguli. Astenia. Stati emorragici e post-emorragici.

Allattamento: Latte abbondante, astenia spiccata con ronzio alle orecchie. Allattamenti prolungati, perdita di liquidi.

Post-partum				
Dall'inizio del travaglio a 10 gg dopo il parto			Pyrog 5 CH + Hep 30 CH x 2	
Per alcuni giorni dopo il parto			Arn 5 CH + Chin 5 CH	
Taglio chirurgico cesareo	Cicatrizzazione si frena la tendenza alle cicatrici cheloidi			Staphy
	Stress			
	Frustrazione (non sono capace di partorire)			
Depressione post-partum	Sodici	Sep. A 200 CH riduce le complicanze del post-partum		
	Note LUES		Hyosc	

Ematologia:

Aplasia midollare (Medullosplenica, Phos-t, DNA, RNA, Arn). **Leucemie** (Ars SULF/PSO-LUES funziona sulla motilità, cura le leucemie, e agisce anche sull'epatocita), Chin.

Anemie, Leucopenie, piastrinopenie : sintomatico Chin 5 CH, di fondo Ars.

Prevenzione delle emorragie		
Emorragie uterine	Sangue color lavatura di carne	Chin
Epistassi (Lach e Phos sono migliorati dalle epistassi, ma Phos non ha crisi ipertensive)		Mill, poi Chin
Per tutte le emorragie: stati emorragici e post-emorragici		a bassa diluiz: Mill, Arn, Chin
Per arrestare l'emorragia		Chin+Sabin, poi Phos

Effetto anti emorragico notevole: prevenzione e terapia delle emorragie e dopo che si è perso molto sangue o liquidi in genere	Chin e a 5 CH prima e subito dopo l'intervento
In caso di facili sanguinamenti: 2-3 gg prima Phos 9 CH + Arn + China	Phos

Oncologia:

Adenocarcinoma della mammella:

- Chemioterapia (riduz eritrociti): **Cadm** 5 CH. **Phos** 5 CH, **Nux-v** 5 CH, **Chin** 5 CH
- Postintervento : **Chin** (disintossicante, perdite di liquidi) 5 CH. **Arn** 5 CH

SINTESI CLINICA

CARB-SULF/LUES. Anti-astenico coincide maggiormente con un affaticamento prolungato o con gravi perdite di liquidi organici. Diarrea senza dolore. Anemia. Dispepsia (eruttaz, pirosi, meteorismo). Bocca secca e amara sete di grandi quantità di acqua fredda, bevande fredde e acide (limonata), tutto è amaro.