

CICUTA VIROSA

(Cic)

Stati convulsivi in soggetti con parassitosi intestinali o a seguito di eruzione dentaria.

ETIOLOGIA

Postumi di TRAUMI cranio-rachidei.

MENTALE

Infantilismo. Ritardo mentale. Ritardo dopo trauma cranico (anche dopo vaccinazione). Riceve un trauma e resta intorpidito (anche un giorno).

MODALITÀ

Aggravamenti:

Con il tocco, con il semplice contatto, urti (**Bell, Cic, Spig, Ther**). Con fumo di tabacco. Con il rumore.

Miglioramenti:

Con il calore e iniziando a mangiare.

SINTOMI GENERALI

Cianosi. Epilessia. Spasmi, tetania.

SINTOMI LOCALI

Cute:

Caratteristiche dermatiti trasudanti. Pustole confluenti che formano croste gialle. eruzioni eczematose con essudato giallo-limone.

DERMATOSI del volto, tipo impetigine, sicosi della barba, eczemi impetiginizzati.

SNC:

Convulsioni tonico-cloniche con perdita di coscienza ed incontinenza sfinterica neurologica. Immobilità con sguardo fisso. Cianosi del volto e delle labbra. Flessione spastica della testa all'indietro.

EPILESSIE generalizzate primarie. Particolarmente le “*assenzæ*” del piccolo male. Epilessie generalizzate essenziali (con inizio dalla faccia, dai muscoli del collo ed estensione agli arti). Epilessie parziali tipo Bravais-Jackson (crisi senza perdita di coscienza).

Occhi:

Contrazioni nervose e sosse muscolari agli occhi : **Cic, Ars, Sulph, Puls, Agar**.

Respiratorio:

Spasmi faringei a seguito di minimo trauma del cavo orale.

Digerente:

Aura gastrica con shock violento o spasmo. Gonfiore all'epigastrio. Senso di freddo o caldo bruciante al petto.

Ginecologia:

Eclampsia :

Eclampsia	
Rossa, convulsioni, congestione	Bell
Cianosi, tetania	Cic
Convulsioni partenti dalla periferia	Cupr
Anche in allopatia	Veratr

SINTESI CLINICA

Postumi di TRAUMI cranio-rachidiani. Stati convulsivi in soggetti con parassitosi intestinali o a seguito di eruzione dentaria.

EPILESSIE generalizzate primarie. Particolarmente le “*assenzæ*” del piccolo male. Epilessie generalizzate essenziali (con inizio dalla faccia, dai muscoli del collo ed estensione agli arti). Epilessie parziali tipo Bravais-Jackson (crisi senza perdita di coscienza). **DERMATOSI** del volto, tipo impetigine, sicosi della barba, eczemi impetiginizzati.