

CYCLAMEN EUROPAEUM

(Cycl)

KN : Come una persona appena svegliata dal sonno comprende solo a metà quanto sta accadendo intorno a sé

DIATESI PSO-SIC-LUES

ETIOLOGIA Afflizione di fronte a preoccupazioni affettive e professionali.

FISIOLOGIA Rimedio prevalentemente femminile sta tra **Puls** (ragazza), e **Sep** (adulta).

COMPARARE con : **Ambr, Puls, Chin.**

DD **Cycl**, diversamente da **Puls**, beve e aggrava all'aria aperta fresca.

- MENTALE**
- Iperscrupolosa, non ha fatto sufficientemente il suo dovere, ha trascurato il partner e per questo prova rimorsi ossessivi
 - Carattere cupo, è triste e malinconica, vuole restare sola, rifugge la conversazione, è piagnucolosa, si crede abbandonata o perseguitata e ciò la rende scorbutica.
 - Indifferente a tutto ed a tutti (**Sep**).

PSO primaria . percezione di sé deviata:

Giudizio errato Ansia di coscienza, come se non avesse compiuto il suo dovere o avesse commesso un crimine/cattiva azione. Terrore di coscienza.

Problematica Malumore, disposizione al pianto. Paura della morte o senso di abbandono o di persecuzione. Immerso in profondi pensieri, desidera solitudine e riflettere sul destino futuro. Pensieri sul presente e sul futuro tanto intensi da piangere.

Volontà Senza inclinazione per qualsiasi attività fino all'imbrunire, non può decidersi al fare la minima cosa. Indifferente e triste, non ha voglia di lavorare. Grande ansia come se qualche grave infortunio sia imminente

PSO attiva : Incapacità di provare gioia o tristezza, anche se si sente costantemente come se avesse finito di soffrire di un dolore imminente, solo quando si eccita.

Affermazione SIC : Tendenza all'indifferenza, malumore, prende con facilità ogni sciocchezza in malo modo e quindi si arrabbia, ostinato, irritabile, con disposizione a criticare, coscienzioso, migliora quando è occupato.

Fuga LUES : L'allegria passata non torna più. Desidera la solitudine, avversione al lavoro ed all'aria aperta. Ha la sensazione che la casa sia molto piccola, ripugnanza ad andare fuori. Solitudine e pianto danno sollievo. Disinteressato tutto il giorno, senza voglia di parlare, insensibilità, scarsa sensazione del suo corpo.

MODALITÀ Mani fredde. Poca sete (**Puls**).

Aggravamenti: All'aria aperta fresca. Freddo. Bevande fredde. Prima delle mestruazioni.

Miglioramenti: Dopo le mestruazioni. Caldo.

Avversioni: Alimenti grassi. Grassi (**Puls, Cycl, Sep**), burro, carne di maiale (**Psor, Puls, Cycl, Ant-c, Carb-v, Lyc, Ric**). Caffè.

Desideri: Limone (**Puls**).

SINTOMI GENERALI Cefalea/Emicrania oftalmica e catameniale (durante le mestruazioni). Precedute (aura) o accompagnate da disturbi visivi, da vertigini, con massima intensità raggiunta durante le mestruazioni
Rinite vasomotoria
Congestione e la pesantezza del basso ventre (**Sep**).
Dismenorrea, menorragia (aumento del flusso mestruale).

SINTOMI LOCALI

SNC: Cefalee ed emicranie catameniali. Precedute (aura) o accompagnate da disturbi visivi, da vertigini. Massima intensità raggiunta durante le mestruazioni.

Ginecologia: Vaginiti ricorrenti con leucorrea (**Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Magn-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja**).

Mestruazioni intermittenti (si interrompono il 2° giorno), irregolari, abbondanti, sangue nero a grumi (**Cham**) con membrane preceduti e accompagnati da dolori al ventre.

Dismenorrea: mestruazioni membranose [tessuto di sfaldamento della mucosa uterina da non confondere con il coagulo]

SINTESI CLINICA

Rimedio prevalentemente femminile tra **Puls** e **Sep**.

Iperscrupolosa, carattere cupo, indifferente a tutto.

Desidera il limone, avversione per gli alimenti grassi. Peggiora con il riposo e l'immobilità e migliora con il movimento e l'esercizio fisico.

Eemicrania oftalmica e catameniale (durante le mestruazioni). Rinite vasomotoria. Congestione e la pesantezza del basso ventre (**Sep**). Dismenorrea, menorragia (aumento del flusso mestruale).