

DIGITALIS PURPUREA

(Dig)

- KN :**
- **Vede solo la metà inf degli oggetti (Aur).** Sensazione come se la parte superiore del campo visivo fosse ricoperta da una nuvola nera.
 - **Gli oggetti sembrano colorati di verde.**
 - **Sensazione come se il cuore stesse per fermarsi bruscamente.**

DIATESI

FISIOLOGIA

INCOMPATIBILE/ANTITODO Chin / Camph

DD

SIC

Scompenso cardiaco

Dig	Cuore
Cloruri	Sistema arterioso
Vip	Vene

MODALITÀ

Aggravamenti:

Con gli odori degli alimenti. La sera.

AGGRAVAMENTI		
Odorato	Odore degli alimenti	Ars, Colch, Dig, Sepia, Tub
	Odore dei fiori	Graph
	Odore del tabacco	Bell, Ign, Spig
	Odori violenti	Bell, Chin, Colch, Ign, Nux-v, Sulph

Miglioramenti:

Stando all'aria aperta (non isterici).

Desideri:

Stare all'aria aperta

Movimento:

- **<:** Con il movimento, camminando. Con il surriscaldamento da esercizio fisico. Alzandosi

SINTOMI GENERALI

Aritmia. Polso molto lento, intermittente, debole. **NON cronotropo negativo come in allopattia.**

Nausee. Vertigini vascolari da ipossia.

Sleep Apnoea Syndrome : Soffocamento appena si addormenta, la respirazione si arresta, numerosi risvegli. Debolezza al mattino svegliandosi, alzandosi, con tremori, polso lento e cefalea.

Asciti cardiorenali con edemi delle estremità fino all'anasarca.

VEDE SOLO LA METÀ INFERIORE DEGLI OGGETTI	
Aur	Sensazione come un velo nero ricoprisse la metà superiore del campo visivo. Ineguaglianza pupillare. Dolori intensi alle ossa dell'orbita , molto sensibili alla pressione < d'inverno e di notte. Disgusto della vita con tendenza ossessiva al suicidio.
Dig	Sensazione come se la parte superiore del campo visivo fosse ricoperta da una nuvola nera < di sera , camminando. Gli oggetti sembrano colorati di verde . Nausee. Aritmia . Polso molto lento, intermittente, debole.

SINTOMI LOCALI

Cardiologia:

Scompenso cardiaco. Il cuore è dilatato, ipertrofico (**Laur**). Debolezza cardiaca. Ipo-perfusione cardiaca.

Polso raro debole intermittente al più lieve esercizio muscolare (**Iod**). Narici cianotiche. **Stasi cardiaca.**

Aritmie. Bradicardia o tachicardia a conduzione lenta (cuore accelerato con polso rallentato – oppure bradicardia periferica con tachicardia centrale).

La sensazione a livello cardiaco è di bradicardia come se il cuore SI STESSE FERMANDO al minimo movimento cosicché tendono a rimanere immobili nel letto.

Cianosi. **Prostrazione.** **Edemi/anasarca** (**Ars, Apoc**).

POLSO LENTO/BRADICARDIA	
Sensazione come se il cuore stesse per fermarsi bruscamente	
Polso molto lento, debole, irregolare e intermittente. Polso bigemino/trigemino. Sensazione come se il cuore stesse per cessare di battere. Tachiaritmie al minimo movimento. <u>Nausee</u> persistenti. Edema con oliguria	Dig
SCOMPENSO CARDIACO	
risposta rapida con 30 CH ogni 15 min. se il rimedio è giusto migliora alla II° somministrazione → ogni 30 min, se migliora ancora → ogni 30 min → ogni ora (come nelle coliche e come nell'asma)	
Uno dei rimedi più importante dell' <u>insufficienza renale</u> e in tutti gli stati che producono EDEMI fino all'ANASARCA con dispnea marcata, RESPIRAZ RANTOLANTE e ritenzione idrica. Farmaco degli <u>edemi</u> e <u>versamenti</u> di qualunque tipo. Cianosi dispnea albuminuria ed	Apoc

anasarca, grande debolezza, il polso è lento e irregolare (Dig). Il quadro corrisponde a degenerazione grassa del cuore e/o lesioni valvolari.	se in fase terminale 200 CH ogni 3 ore
<u>Bradiaritmie</u> . Il cuore è dilatato, ipertrofico (Laur). Urina scarsa scura, <u>asciti</u> cardiorenali con edemi delle estremità fino all'anasarca, il fegato sensibile, doloroso, con itterizia, narici cianotiche (cuore da stasi, fegato da stasi, rene da stasi, e prostata). Cianosi-prostrazione, anasarca (Ars, Apoc)	Dig
DISPNEA INTENSA (Am-c, Ars, Dig), vera ORTOPNEA con dolori precordiali (Ars, Cact, Crat, Stroph), polso rapido ma debole e irregolare. Urine scarse ed edemi. Corrisponde a <u>disturbi secondari ad abuso di tabacco</u> (Cact) e dopo bronchiti croniche, enfisema o congestioni polmonari infiammatorie che comportano un'inabilità a sdraiarsi a letto. <u>Cuore dilatato</u> con assenza dell'ipertrofia dovuto ad <u>enfisema</u> o a <u>malattie renali</u> .	Conv
SENSAZIONE DI <u>PARALISI</u> DEL CUORE QUANDO VA A DORMIRE (Dig, Lach, Grin) e così il paziente si sente costretto ad alzarsi e camminare. Disturbo principale la <u>debolezza</u> a tutti i livelli che paralizza il paziente fisicamente e psicologicamente – <u>paralisi per PAURA</u> -. Si usa all'inizio delle lesioni organiche cardiache e nei disturbi funzionali di origine astenica. Ha paura che quando va a dormire muore → sta sveglio e cammina ma è fiacco (le gambe gli tremano quando ha paura) → rimedio delle <u>paralisi e anche della sclerosi multipla</u> (contrario di Acon che da eccitazione).	Gels
ANGOR	
<u>Tachiaritmie</u> al minimo esercizio (Dig). Sensazione di costrizione con ansia precordiale che obbliga il malato a cambiare costantemente posizione. Agitato, non può restare in un posto. <u>Vampate di calore</u> , ha sempre troppo caldo. Ansioso e irritabile se non mangia. <u>Dimagrisce</u> pur mangiando molto. <u>Indurimenti</u> delle ghiandole e dei gangli	Iod

Urogenitale: Nefropatie/acute e croniche. Rene da stasi.
Minzione a gocce con impotenza e pensieri lascivi nell'anziano. Ipertrofia prostatica.
Edemi o anasarca con oliguria/anuria.

Digerente: Nausee persistenti. Fegato sensibile, doloroso con itterizia (fegato da stasi).

SINTESI CLINICA Grande componente SIC. Scompenso cardiaco. Insufficienza cardiaca con cardiomegalia. Polso lento e aritmico. Cianosi. Fegato da stasi. Edemi, oliguria, anasarca. Prostrazione.