

DIOSCOREA VILLOSA

(Dios)

KN : Sensazione di torsione addominale

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Cham, Camph**

COMPARARE con : **Coloc, Nux-v, Cham, Bry.**

DD Al contrario di **Coloc, Dios** sta meglio quando si estende.

Dolori mestruali, acne, dermatiti, pleurite : **Sulph-i**

SINTOMI GENERALI Sensazione di torsione addominale. Cambia posizione continuamente.
I bambini molto piccoli che s'inarcano "*a ciriola*" (cioè si estendono e stanno meglio).

SINTOMI LOCALI

Digerente:

Coliche intestinali, epatiche e renali (coliche addominali prevalentemente nei FOSF) sia litiasiche che alitiasiche.

Dolori molto forti violenti ad ondate irradiati alle mani ed ai piedi in tutte le direzioni, che ➤ se il paziente si estende, o si estende all'indietro, o si siede dritto, o cammina.

Feci molto scarse, liquide, giallastre.

Ginecologia:

Dismenorree spasmodiche con dolori crampoidi (**Act-r, Caul, Cham, Coloc, Mag-p, Vib, Dios**).

DISMENORREE		
Vannier : aggravano durante le mestruazioni : Act r , Amm c, Arg n, Bell, Cocc, Con, Graph, Hyosc, Kreos, Mag-c , Plat, Puls, Sep, Sil, Ver alb, Vib op , Zinc		
Dolori mestruali , acne, dermatiti, pleurite		Sulph-i
Spasmodiche nei FOSF anche con coliche addominali		
Fibromiositi e dismenorrea. Mestruai abbondanti con coaguli e con dolori crampoidi violenti e trasversali cervicali ➔ utero ➔ cosce. Disturbi nervosi, isterismo, cefalea prima durante e dopo le mestruazioni (più il flusso è abbondante più il dolore è forte – dolori nel corso delle mestruazioni). Il Lach dei FOSF, ma non migliora all'inizio delle mestruazioni.		Act-r , FOSF-MUR/TUB ipersex
Freddolosa. Debole. Tremori interni. Ossa e piccole articolazioni anche nell'artrite reumatoide delle donne che hanno questa dismenorrea. Post-partum o aborto quando i dolori di contrattura perdurano da molto tempo. Dolori discontinui crampoidi verso le cosce.		Caul
Isterica. Intolleranza al dolore. Anticipanti abbondanti. Difficoltà del mestruo ad avviarsi. Sangue nerastro, grossi coaguli.		Cham bambini molto piccoli
Dolore con inizio e termine improvvisi. <u>Meglio in flessione</u> .	Farmaci di colica	Coloc MUR, bambini molto piccoli
Perdite membranose. <u>Meglio con caldo, latte caldo, borsa di acqua calda, flessione, pressione</u> . Diarrea durante le mestruazioni. Donne giovani e adolescenti. Spasmi.		Mag-p FOSF, bambini molto piccoli
Isterica. Perdite membranose poco abbondanti (poco flusso + membrane ➔ dolore), regione lombo-sacrale. Lipotimie.		Vib FOSF, adolescenti
Dolori crampoidi e coliche intestinali, epatiche, renali.		Diosc bambini molto piccoli che s'inarcano (<i>ciriola</i>)

SINTESI CLINICA

Coliche intestinali, epatiche e renali (coliche addominali preval nei FOSF).

Con dolori molto forti violenti ad ondate.

Feci molto scarse, liquide, giallastre.

Dismenorree spasmodiche con dolori crampoidi.