

ELAIES

(Elaies)

Zone cellulitiche indurite con parestesie ed anestesie

CELLULITE				
↓ Bad (TUB) La cellulite dei fosforici ↓ Phyt (LUES) ↓ Elaies			INSUFFICIENZA di CIRCOLO (TUB) ↓ Angelica Insufficienza + artrosi (diluizione bassa) ↑ ARTROSI Iniziale Rhus-t, Aran (arti sup) ↓ Graph ↓ RADIOTERAPIA ↓ X-Ray	↓ Sil (TUB) ↓ Natr-s (SIC) ↓ Dor
FOSF o MUR (cellulite dei FOSF). Infiltrazione indurita del derma. Cicatrici cheloidee pallide. Freddolose. Ipertiroidiee Bad 5 CH Edema duro dopo Rx-terapia Dor 5 CH Zone indurite con parestesie e anestesie Elaies 5 CH Coinvolta la parte alta. Infiltrazione cellulitica del ginocchio artrosico e sul rachide nella sindrome trofo-statica menopausale. Cute da mixedema. Geloni. Graph 5 CH Cellulite dolorosa. Obesità. Lipomi (SIC + LUES). Cicatrici dure infiammate doloranti. Artralgie. Mastopatia (obbligatorio) Phyt 7 CH Lipodistrofie. Placche nodose di indurimento sottodermico in portatrici di artrosi dell'anca, sacroileiti, lombalgia. Idrolipopessia, sindrome premenstruale. Radix 7 CH Simile a Bad. Cellulite grassa. Pelle pallida e pergamenacea. Sil 7 CH Coinvolta la parte bassa. Sempre. Specie per etiologia iatrogena o infettiva e nelle manifestazioni adipo-cellulitiche del bacino, natiche, cosce, fino alle caviglie. Thuja 7 CH Cellulite ipersensibile e dolorosa a livello di addome e cosce Natr-s 7 CH CARB/PSO-SIC (diabete nel CARB). Bov 7 CH				
MUR. Tindal (proteine dell'umor d'acqua) Kali-m 7 CH, agisce sulla formazione della fibrina				
SIC + TUB	Thuja +	Bad, Sil, Kali-m		
SIC + LUES		Dor, Elaies, Phyt		
SIC + PSO compensata		Graph		
R42 (componente circolatoria) - R59 (riequilibrio endocrino) - R60 (drenatore ematico e linfatico) - R63 (flebotomie periferiche)				
Organoterapia	Hepatine 4 CH + Renine 4 CH + Muquesedu Colon 4 CH + Tissureticulo-endothelial 7 CH + Axe-cortico-hypothalamique 9 CH			