

FERRUM PHOSPHORICUM

(Ferr-p)

KN :

Si ammala lentamente

COSTITUZIONE

FOSF

DIATESI

SIC-TUB

FISIOLOGIA

Attività antiflogistica ed antipiretica

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Tra **Acon** e **Bell** da un lato e **Gels** dall'altro.

COMPARARE

con : **Acon, Chin, Ars, Graph, Petr.** Per la cefalea vascolare con **Gels**.

DD

I FERRUM				
Segni classici di Ferrum : ANEMIA, debolezza, astenia, congestione emorragica. Magro ma pletorico, viso rossiccio. Atonia gastro-intestinale (Chin molta flatulenza).				
Ferr	Devono difendere le proprie scelte			
Ferr-ar	Debole ansioso agitato.	Anemia perniciosa con epato e splenomegalia. Malaria.		ANEMIA. Dolore sciatico. Ipersensibilità emotiva, aggravano con le emozioni. Pareti venose.
Ferr-br	Ptosi uterina	Ipertiroidismo	<u>Vithoulkas</u> : Ptosi, urlano e poi piangono senza ragione. Ansia. Pesantezza alle gambe. Capelli.	
Ferr-i	Vuole sentirsi libero : NO matrimonio			
Ferr-s	Rimangono saldi nella loro relazione e la difendono			
Ferr-m	Si devono mantenere forti per poter seguire i figli			
Ferr-p	Congestione febbrile. Otite dolorosa notturna. Emorragie. No cambiamenti		<u>Vithoulkas</u> : NO traffico. Mania/depressione non grave. Emorragia come Phos	
Ferr-cy	Turbe nervose. Spasmi colici			
Ferr-per	Tosse, con carnagione florida			
Ferr-t	Dolori precordiali e calore al cardias			

Caps (peperoncino) ha i sintomi più rapidi di **Ferr-p**. **Bruciore** con sensazione di costrizione spasmodica. Dolore alla deglutizione. Frequente coinvolgimento dell'**orecchio**.

AGISCE

Usato sia come rimedio costituzionale sia come farmaco acuto.

EVOLUZIONE

TIROIDE			
La tiroide è un punto TUB			
Ferr-i	Ferr-p + Ipertiroidismo	Segni classici di Ferr: debolezza, astenia, anemia, congestione emorragica + Sintomi di ipertiroidismo: palpitazioni, tremori, dimagrimento, ipertrofia tiroidea	Magro, anemico, ma pletorico con viso rossiccio

MENTALE

Sogni di sangue (patologie acute) (**Phos** TUB, **Ferr-p** acuto, **Crot** LUES).

MODALITÀ

Si muove lentamente, non può stare fermo né muoversi.

SI AMMALANO	
acutamente	più lentamente
Acon	Ferr-p
Bell	Gels
	Bry

Aggravamenti:

Notte (la sera e tra le 4 e le 6). Al tocco. Con le scosse.

Miglioramenti:

Dolore meglio con calore.

Lateralità

dx

SINTOMI GENERALI

Soggetti emotivi pallidi anemici con violente congestioni locali.

•

Qualunque patologia, ai FOSF passa l'influenza e tutto il resto

- **Sindrome influenzale** ad inizio graduale disturbi infiammatori febbrili specie catarri respiratori. **Vampate** di calore alternato a pallore. **BRIVIDI**, sensazione di freddo.
- **Tendenza emorragica** da qualsiasi orifizio.
- **Suppurazione** a inizio **lento** e insidioso. I° periodo fase infiammatoria Febbre mai elevata 37-37.5. Pelle rosso scuro (anche le orecchie) ed umida. Presenza di fenomeni **emorragici** ed epistassi.
- **Cefalea**.
- **Guance rosee** e stanchezza generale.
- **Ustioni**.

SINTOMI LOCALI

Influenza: Febbre debilitante con brividi intorno alle 15. **Sete intensa e sudorazioni notturne** che non recano sollievo. Brivido e sale la febbre e beve solo durante il brivido e faccia rossa durante il brivido.

INFLUENZA		
R6gtt + Echinacea+ vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti		
Esordio progressivo	FOSF	Febbre alta/moderata, alternanza di arrossamento e pallore del volto, sudorazione, tachicardia, possibili epistassi, otite. Cefalea, otalgie congestive, NON essudato tonsillare. Febbre cefalea con sensazione generale di stanchezza

Volto: **Calore e rossore** circoscritto alle guance, alternato a pallore

Testa: **Cefalea** congestizia, pulsante con vampe di calore meglio con applicazioni fredde. Non sopporta i rumori ed il tocco anche lieve (**Bell**).

Occhi: **Rossi congesti** con fotofobia e lacrimazione intensa con sensazione come di sabbia che costringono a massaggiare le palpebre.

Orecchie: Primo stato dell'**otite** [dx]. Più marcata minaccia di otite rispetto a **Bell**, membrana del timpano rossa/rosata e rigonfia. Febbre moderata. Sfinitezza. **Dolori irradiati all'orecchio**. Anche da un orecchio all'altro o da una tonsilla all'altra. **Tendenza a sanguinare e a piccole epistassi** **Otite** acuta. Sordità temporanea da raffreddore. Otite catarrale media.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontroli : Cham) + All-c	
Otite nel bambino: Mang, Caps.	
Chinin-s	
Catarrali	
Dolore. Febbre meno elevata di Bell . Otiti emorragico-bollose.	Ferr-p
Purulente	
dopo paracentesi o otorrea spontanea	
Essudati biancastri densi viscosi. Cloruro di K pericarditi sierose	Kali-m + Ferr-p

Naso: Primo stadio del raffreddore con mucosità miste a sangue o epistassi franca.

ORL: **Faringe** arrossata secca con sete intensa, con senso di costrizione e fatica alla deglutizione.

Tonsille rosse e gonfie. **Laringite** dei cantanti. Dopo operazioni alla gola o al naso per frenare il sanguinamento. Catarro striato di sangue.

Cardiologia: **Tachicardia** con polso corto rapido molle.

Cardiopatia arteriosclerotica con **angor** complicato da patologia articolare : **periartrite scapolo-omeroale** [sn] (**Agar** contratture, **Led** dolori migliorati dal freddo, **Ferr-p**, **Phos. Sulph**).

Respiratorio: Primo stadio di tutte le **infiammatorie** catarrali.

Rinite allergica : Secrezioni nasali striate di sangue che si accompagnano a febbre moderata. Tosse secca con senso di solletico laringo-tracheale. Possibile otalgia con timpano rosato.

Faringo-tonsilliti

Faringo-tonsilliti con angine rosse (Blackwood: Baryta)	
Ferr-p : stesso quadro di Bell , più attenuato. È tuttavia più marcata la minaccia di otite . Febbre moderata. Sfinitezza. Dolori irradiati all'orecchio . Anche da un orecchio all'altro o da una tonsilla all'altra. Tendenza a sanguinare e a piccole epistassi .	
DOLORE ↓ CON BEVANDE FREDE E ↑ CON BEVANDE CALDE	

Digerente: Antiflogistico. **Acidità gastrica** (**Phos**, **Ferr-p** e **Ars**). Scariche acquose (antidiarroico **R4**).

[la diarrea provoca sollievo : **Abrot**, **Natr-s**, **Zinc**].

Reumatologia: **RAA** (TUB) con dolori erratici.

Ferr-p periartrite scapolo-omeroale [dx] - [sn] : **Ferr-p**, **Phos**, **Sulph**].

Urologia: Patologia prostatica/**prostatite** (SIC o TUB). FOSF enuresi. Nicturia, incontinenza, pollachiuria.

SINTESI CLINICA

FOSF/SIC-TUB. Si ammala lentamente. Attività antiflogistica ed antipiretica.

Qualunque patologia, i FOSF migliorano/guariscono.

Sindrome influenzale ad inizio graduale disturbi infiammatori febbrili specialmente flogosi respiratorie ed otiti.

Vampate di calore/rossore alternato a pallore. BRIVIDI, sensazione di freddo.

Tendenza emorragica da qualsiasi orifizio.

Cefalea, guance rosee e stanchezza generale.