

FOLLICULINUM

(Foll)

DIATESI LUES, SIC
FISIOLOGIA Ormone naturale secreto dall'ovaio
COMPLEMENTARE/SINERGICO Complementare di **Lach** per la sindrome premestruale.
DD

Foll	Lach
Ipereccitabilità sessuale, Sindrome premestruale, Cefalea, Aggrava con il caldo, con il riposo, Migliora con il movimento ? e con il fresco	
NON lateralità	Da sn a dx
Migliora al 3° giorno delle mestruazioni	Migliora subito all'inizio delle mestruazioni
Aggrava con l'ovulazione	NON peggiora durante l'ovulazione
Sta male a fine giornata (angoscia), NON aggrava con il sonno	Aggrava di notte ed al mattino

AGISCE a 4 CH **stimola ovulazione** (per cui si usa nelle amenorree) (come **Puls**).

MENTALE Sindrome bipolare ormonale, alternanza eccitazione e depressione. Ipersensibilità al calore, al rumore, al contatto. Angoscia a fine giornata.

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

MODALITÀ NON lateralità, NON aggrava con il sonno
Aggravamenti: Con l'ovulazione prima delle mestruazioni, con il caldo.
Miglioramenti: Con il fresco ed al 3° giorno del flusso mestruale.

SINTOMI GENERALI

- Cefalea.
- Sindrome premestruale.
- Ipereccitabilità sessuale.
- Amenorree (stimolo per le mestruazioni).

SINTOMI LOCALI

Cute: **SIC** : Ritenzione idrica. Cellulite. Eruzioni secche periungueali (SIC, come **Caust**).
Acne (ormoni –ciclo–, alimenti, psiche).
Respiratorio: Rinite. Angina respiratoria catameniale. Costrizione laringea (**Foll, Ign, Lach**).
Cardiovascolare: Angina pectoris, extrasistoli, tachicardia, ecchimosi.
Digerente: Meteorismo, stipsi, epatomegalia (come **Lach**),

Urogenitale:

- Dismenorrea.
- Utero fibromatoso con emorragie, come **Aur-m-k** e diversamente da **Aur-m-n** (utero fibromatoso senza emorragie).
- ENDOMETRIOSI.
- Mastopatie (monache).
- Sterilità.
- Cistiti anche abatteriche

TERAPIA/DOSE Stimolatori ovarici aspecifici : **Foll** 4 CH al mattino + **Puls** 5 CH la sera sospendere durante il ciclo.

SINTESI CLINICA

LUES. Stimolante ovarico (come **Puls**).

Sindrome bipolare ormonale, alternanza eccitazione e depressione. Ipersensibilità al calore, al rumore, al contatto.

Ipereccitabilità sessuale. Sindrome premestruale. Cefalea.

Acne. Cellulite. Costrizione laringea. Angina pectoris. Dismenorrea. Endometriosi.