

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

(Gels)

CODARDIA. Nel repertorio di Kent, **Gels** è segnalato alla voce "*cowardice*" (codardia) al massimo grado.

Timido, emotivo, ansia, paura, attacchi di panico, depressione, tremori, diarrea emotiva, inibizioni.

Patologie del SN, (alterazione dell'equilibrio simpatico-parasimpatico, Sclerosi a placche, Parkinson, paralisi).

KN : Caratteristica di **Gels** è che durante lo stress/paura **si blocca** (**sensazione di paralisi**) e **NON** riesce a superare l'evento.

COSTITUZIONE CARB prevalente-SULF in fase astenica (scompensato)

DIATESI LUES-SIC

ETIOLOGIA Emozioni, cattive notizie. Tabacco.

FISIOLOGIA **Paretico, SNP corna anteriori (motorie) del midollo.** Convulsivo. Ipotensivo, ansia continua astenia sposato con 37,2°C. Farmaco acuto e cronico.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Calc, Sep**/viene associato alla terapia con **Acon**

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Chin, Coff, Dig.**

COMPARARE con : **Ign, Bapt, Ip, Acon, Bell, Act-r, Mag-p.**

DD **Meph** : Soggetto sposato per calo energetico ($\approx$ **Zinc, Gels**).

Arg-n : ansia di anticipazione, ma non si blocca.

Carattere compiacente per :

<u>Codardia</u>	Gels
Guadagnare affetto	Puls
Paura di perdere il controllo sulle relazioni affettive (trattiene le emozioni)	Staphy

AGISCE SN con congestione passiva. Agisce sulle **corna anteriori** del midollo.

EVOLUZIONE Acuto di **Natr-m.** /// **Gels** poi **Staphy.**

Thuja	→	Con	←	Caust ($\approx$ Alum)	→	Plb
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE

[ANSIOSO-FOBICO]

- ANSIA da prestazione e di anticipazione** con profonda sensazione di insicurezza (**Arg-n, Gels, Ign, Mosch** –donne logorroiche che svengono-) che porta alla debolezza dei muscoli per cui si immobilizza con tremori alle gambe. Emotivo,

Emotivo	Calc, Gels, Ign, Puls, Arg-n
---------	-------------------------------------

l'emozione lo rende muto, timido,

Timido	Natr-m, Baryta, Calc, Calc-s, Gels, Sil (determinato), Puls
--------	---

passivo, si sente impotente, incapace di fare fronte, desiderio di nascondersi

- Si blocca tremante con sensazione che il cuore cesserà di battere se non riuscirà muoversi.** (invece **Bell** e **Lach** si arrabbiano fino al delirio, al contrario di **Gels** e **Phos-ac**).
- PAURA** della morte (nel repertorio di Kent al massimo grado), degli spazi, della folla, della solitudine, immotivata di povertà (come **Calc-f**), degli animali, di fare, di prendere aerei, telefoniche, ascensori, di impazzire. Agorafobia (70% **Arg-n**). Ansia preoperatoria (**Acon, Bell, Gels, Ign, Sulph**).

Paura che penalizza la realizzazione lavorativa. Incapacità di autorealizzazione. Astenia con paura di perdere l'autocontrollo. Sviene durante l'agitazione.

- Panico da esame/impegni pubblici con sensazione di paralisi (come **Arg-n** che però non si blocca), è il rimedio della paura dello studente. Timore di parlare in pubblico, di sostenere una prova, di essere oggetto di attenzione, non vuole essere costretto ad esprimere un'idea, desidera stare solo ed in pace.
- Attacchi di panico, con senso di paralisi (tutti LUES eccetto **Rhod, Kali-p, Calc**). Paura di tutto. Ansia, debolezza, tremori. Qualsiasi sforzo produce tremore dei muscoli, le ginocchia possono battere, le gambe si possono stringere, e le mani possono tremare.
- Avversione alla compagnia (**Anac, Baryta, Gels, Ign, Natr-m, Nux-v**) per sentimento di inadeguatezza che predispone alla sottomissione ed alla compiacenza.
- Insonnia (come **Arg-n**). Insonnia per ansia dopo intensa emozione o abuso di tabacco. Ansia da anticipazione. Ripensa ai suoi problemi. Si inibisce, apatia, desiderio di solitudine, paure. Tremori.
- Obnubilamento del sensorio
fase stenica : Eccitazione, tremori, disturbi della coordinazione motoria, crampi.
fase astenica : Paresi, prostrazione generale, sensazioni di pesantezza agli arti e alternanze di simpaticotonia e di vagotonia. Torpore mentale. Impulso suicida per defenestrazione
- Bambino con ritardo mentale, insicuro, si aggrappa alla madre.

MODALITÀ Assenza di sete (anche durante la febbre fauci secche senza sete).

NON BEVONO (ACQUA)	
Neurologici che migliorano la Sclerosi multipla	Arg-n ansia di anticipazione, Zinc, Gels, Alum
Giorni caldi e notti fredde.	

Aggravamenti: Con la paura, con un'emozione mentale o con un'eccitazione.
Sforzo mentale
Pensando alle proprie sofferenze (**Baryta, Gels, Ox-ac, Sabad**).
Cattive notizie
 Al sole, col caldo umido, d'estate, prima del temporale, dalle 10 alle 11 (**Gels, Natr.m**). Cambiamenti di tempo.
 La notte (lombosciatalgia)

Miglioramenti: Urinando e con gli eccitanti (bevande stimolanti). All'aria aperta.
 Meglio tenendo la testa alta e dopo abbondante minzione che annuncia la fine della crisi

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Avversioni: **Non sopporta il tabacco, si usa per smettere di fumare**, provoca cefalea.

Desideri: Stare all'aria aperta. Bevande stimolanti.

SINTOMI GENERALI

- Acuto e cronico. Disturbi psicosomatici dopo e per un'emozione: debolezza, tremori, coliche, eccitazione, diarrea emotiva, purito (**Ign**).

<u>Sindrome ansiosa</u> Somatizzazione sulle <u>mani</u>
Arg.n onicofagia
Gels CARB
Med pellicine
Kali-br

- Astenia marcata (febbre), debolezza estrema con tremori, stanchezza e sonnolenza, insonnia da surmenage o da fumo. Tremori del mento e della lingua.
- Sintomi a carico del SN
 - Tremore, incoordinazione muscolare, vertigine ad insorgenza occipitale, cefalea cervicale, paralisi e paresi flaccida (invece **Arg-n** fa i solchi per terra).
 - Emicrania oftalmica che inizia con fotofobia e finisce con abbondante diuresi. Palpebre molto pesanti (a mezz'asta).
 - Alzheimer, Sclerosi multipla, Parkinson, Menière.
- Onanismo.
- Influenza, cefalea, assonnato con un mal di testa occipitale, dolore in gola, bocca secca, parla con difficoltà, la lingua si aggrancia alle arcate dentali.

In fase acuta febbre modesta 38-38,5 °C con grande astenia. Assenza di sete (anche durante l'influenza fauci secche senza sete). Invece influenza con sete **Bry** 38-38,5 [**Eup-per**, come **Bry**, 38-38.5 ma più grave (dolori oculari e dolori ai denti) e con sete – **Bell** 39-40].

SI AMMALANO	
VIOLENTEMENTE	PIÙ LENTAMENTE
Acon, Bell	Ferr-p, Gels, Bry

- Colpo di calore
- Debolezza estrema. Sopraffatto dalla stanchezza e perplesso da ciò che sta accadendo. Potrebbero esserci alterazioni nella visione e dolori muscolari. Assonnato con un mal di testa occipitale. Membra con tremori del mento e della lingua, mascella inferiore cadente, incoordinazione.

TREMORI	
Difficoltà a tirare fuori la lingua (tremula)	Gels, Ign

- Tachicardia o bradicardia Ipertensione
- Lombosciatalgie.
- Febbre da fieno (Occhi gonfi e pesanti, starnuti con secrezione acquosa dal naso, apatico svogliato, sonnolento, tremante, mal di gola con sensazione di nodo alla gola.).
- Prurito sine materia

SINTOMI LOCALI

Facies:

Tremori. Parla con difficoltà, la lingua tremula, secca si aggancia alle arcate dentali quando la si tira. Isteria.

SNC e SNP

Azione sul SNC e SNP. DETERIORAMENTO CEREBRALE. Incoordinazione dei movimenti (**Gels, R51**). Obnubilamento del sensorio. In tutti i casi di tremore statico e dinamico coinvolte le corna anteriori del midollo. Ipertonia. Nevralgie. Meningite. Demenze.

Azione sul SNC e SNP		
Se la malattia colpisce polmoni, reni e intestino l'intelletto è più disturbato		
Poca concentrazione	Gels	Anche Zinc, Plb

[**Caust + Natr-s** → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : **Con**].

- I **SCLEROSI A PLACCHE** (LUES + screzio SIC). Migliora la Sclerosi Multipla (**Zinc, Alum**). Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa Farmaci principali della Sclerosi a placche **Caust, Natr-m, Natr-s**,
- II **PARKINSON** (LUES). Terapia: **Gels + Rhus-t + Arg-n**. **Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici**
- III **PARALISI** Pazienti confusi con completo relax e prostrazione di tutto il sistema muscolare. Deficit di coordinazione muscolare, i muscoli si rifiutano di obbedire alla volontà. Astenia (febbre con astenia marcata).

Paralisi	
Motoneurone superiore	Motoneurone inferiore
Gruppi di muscoli	Singoli muscoli
Ipertonia	Ipotonia
Iperiflessia	Ariflessia
Riflessi patologici	NON riflessi patologici
Muscoli normotrofici	Atrofia muscolare
Non fascicolazioni	Fascicolazioni

A) Totale paralisi motoria. Corna anteriori

Paralisi Vannier	Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t.
------------------	--

B) Paralisi per lesione del motoneurone superiore Vannier

Aur, Gels, Hyosc, Magn-p, Merc, Phys, Tar-h

- C)** Paralisi atonica del facciale. Paralisi a frigore (paralisi di Bell nervo faciale VII). Atonia facciale, intorpidimento/paresi della lingua e del lato colpito, difficoltà a tirar fuori la lingua che è tremula (come **Ign**) (terapia : **Acon**, **Caust**, **Gels**).

D) <u>Ptosi palpebra superiore</u> con difficoltà ad aprire gli occhi al risveglio
Ptosi palpebrale: Caust , Gels , Zinc , Phos , Sep , Alum > a sn, Lues

E) <u>Poliomielite</u>	Rimedio epidemico prevalente che può essere : Cocc , Cur , Gels , Lath . “Uno degli specifici più comuni è Lath efficace quasi al 100%. Ha fornito una protezione trentennale a molte migliaia di casi esposti all’ infezione”
	Lath 1M dose singola o una dose ogni 2 sett. Utilizzato per 40 anni come preventivo delle paralisi infantili
	Carb-ac o Lath o Plb XM o Phys M
	Bell , Gels , Phys . Anticipano di molto la fase paralitica

F) <u>Paralisi difterica Vannier</u>	
(A) <u>Precoce</u> (prima settimana) : paralisi del nervo glossofaringeo (disturbi di fonazione -rinolalia- , paralisi del velopendolo e reflusso idroalimentare nelle cavità nasali durante la deglutizione).	Arg-n , Aur , Caust , Cocc , Gels , Grind , Lach
(B) <u>Tardiva</u> (quarta settimana) : paralisi dei nervi oculari (turbe dell’accomodazione e dei movimenti coniugati), del nervo facciale , del nervo vago , dei nervi spinali (polineuriti, poliradiculi tronco, arti e diaframma).	

- IV **CEFALEA A PREDOMINANZA OCCIPITALE**, irradiata al collo e alle spalle. Cefalea congestizia a fascia, dall’occipite alla fronte (al contrario di **Lac-del** che va dalla fronte all’occipite) che scompare con la minzione che annuncia la fine della crisi (il diuretico non ha effetto sulla cefalea). Eemicranie precedute da disturbi visivi. Meglio tenendo la testa alta.

Astenici, forte emotività	
Cefalea peggiorativa se fuma	Gels
Cefalea sn o nevralgia con fortissimi dolori	Spig

V **ISTERIA**

VI **VERTIGINI**

- VII **LOMBOSCIATALGIA** con dolore bruciante intermittente con tendenza alla cronicità, e tremore dell’arto.

- VIII **INSONNIA** per ansia dopo intensa emozione o abuso di tabacco.

- IX **ANSIA DA ANTICIPAZIONE**. Ripensa ai suoi problemi. Si inibisce, apatia, desiderio di solitudine e timore d’impazzire. Tremori.

- X **MEMORIA** indebolita, difficoltà a trovare la parola esatta. Alzheimer, Parkinson (**Hyosch**, **Gels**, **Arg-n**, **Caust**, **Aur-s** movimento oscillatorio).

Oculistica:

Paresi oculari e palpebrali, dolori oculari.

Attacchi preceduti da disturbi della vista (diplopia). Dolori ai globi oculari che sembrano contusi (**Arn**).

Cardiovascolare:

Bradycardia. Tachycardia. Polso lento a riposo, accelerato con il movimento. Sensazione come se il cuore stesse per cessare di battere se non fa un movimento. Sensazione di mancamento imminente, lo obbliga ad alzarsi e a camminare. Debolezza estrema delle membra con tremori. SENSAZIONE DI PARALISI DEL CUORE QUANDO VA A DORMIRE (come **Dig**, **Lach**, **Grin**) e così il paziente si sente costretto ad alzarsi e camminare. Disturbo principale la debolezza a tutti i livelli che paralizza il paziente fisicamente e psicologicamente – paralisi per la paura-. Si usa all’inizio delle lesioni organiche cardiache e nei disturbi funzionali di origine astenica. Ha paura di morire quando va a dormire → sta sveglio e cammina ma è debole (le gambe tremano quando ha paura) → rimedio delle paralisi e anche della sclerosi multipla (contrario di **Acon** che da eccitazione).

Genito-urinario: Congestione passiva venosa da flogosi.
 Contrazioni inefficaci del parto. Enuresi.
 Impotenza da stress/ansia (**Puls, Con, Plat, Gels, Arg-n** -erezione che cessa durante il coito-).
 Incontinenza o ritenzione urinaria.

Miglioramento dopo aver urinato	Gels
Miglioramento dopo una minzione abbondante	Gels., Ign
Bruciore alla vescica	Apis
Poliuria notturna	Natr-m, Lyc
Atonia vescicale	Hep
Incontinenza consapevole	Aur
Incontinenza urinaria per paralisi muscolare a <i>frigore</i> o dopo infarto	Rhus-t

Immunologia: **Polimiosite** con astenia, non riesce a dirigere gli arti, *crampo dello scrivano*, peso agli arti inferiori.

Digerente: Diarrea acquosa con/senza flatulenza dopo emozioni o paure con debolezza delle gambe e delle risorse intellettuali [un grado meno grave della paura rispetto ad **Acon**]. La paura → defecazione. [Si deve escludere la celiachia che è curata da **Chin**].

Mal Infettive: Influenza, quando il malato ha la debolezza e tremore. INFLUENZA CON ADINAMIA.

INFLUENZA			
R6gtt + Echinacea+ vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti			
Esordio brutale	CARB	Rubor, febbre elevata la sera, convulsioni da ipertermia, pelle calda, occhi rossi, midriasi , abbattimento, delirio, angina, NON sete , cefalea pulsante, ipersensibile al freddo, fotofobia, lacrimazione. Otite dx . Deglutizione dolorosa a dx . NON movimento NON scosse. Viso luminoso con insorgenza improvvisa di febbre alta. Cefalea pulsante. Gels in fase acuta febbre modesta 38-38,5 °C con grande astenia. Assenza di sete (anche durante l'influenza fauci secche senza sete). Invece influenza con sete Bry 38-38,5 [Eup-per come Bry 38-38,5 ma più grave e con sete – Bell 39-40]	Bell dx (CARB / SULF) (Scarlatina) infiammaz, poi Calc
Esordio progressivo	CARB/ SULF	Grande prostrazione (SONNOLEZZA E STANCHEZZA), tremore, NON sete , palpebre pesanti. Volto rosso, temperatura bassa, polso variabile dissociato dalla febbre. Come Bry (con sete) sta tutto il giorno a letto fermo, ma per pura fatica. Gels in fase acuta febbre modesta 38-38,5 °C con grande astenia, torpore, confusione, cefalea occipitale e debolezza degli arti. Assenza di sete (anche durante l'influenza fauci secche senza sete). Invece influenza con sete Bry 38-38,5 [Eup-per come Bry 38-38,5 ma più grave e con sete . Bell 39-40 <u>non ha sete</u>]	Gels, Arg-n

Malaria : **Chinin-s, Gels** (Denman).

Oncologia: Per lo STRESS/ANSIA che accompagna le indagini diagnostiche (agoaspirato, TAC, risonanza magnetica) e i cicli di trattamenti antitumorali (chemio/radioterapia, terapie ormonali). Iniziare il trattamento 1 o 2 giorni prima.

TERAPIA/DOSE

Ansia preoperatoria: **Acon, Bell, Gels** (tre volte al giorno per i tre giorni che precedono l'intervento), **Ign** e **Sulph**. (Phos 200 CH 1 giorno prima dell'operazione previene il malessere che segue la somministrazione di Cloroformio). Ansia che persiste anche dopo l'intervento.

Ansia prima di esami e impegni pubblici: **Arg-n, Gels**

Diarrea emotiva : **Bell**.

Influenza (vedi): **Ars, Bry, Carbo-v, Eup-per, Gels, Lach, Phos, Rhus-t, Sep, Sulph, Infl, Nux-v**

Malaria (vedi): 95% dei casi : **Natr-m, Ars, Chinin-s**, poi anche **Sulph, Gels, Aran**. Oppure terapia in generale: **Chinin-s, Gels**.

Parto: durante il travaglio tutti a 5 CH : **Caul + Arn + Act-r + Puls + Gels**. Dopo paure o traumi psichici durante la gravidanza.

SINTESI CLINICA

CARB prevalente-SULF in fase astenica (scompensato)/LUES-SIC

Timido – emotivo - paura – tremori - diarrea emotiva – inibizioni – codardia al massimo grado.

Personalità ansioso-fobica con profondi sentimenti di insicurezza. ANSIA da prestazione e di anticipazione.

PAURA della morte, degli spazi, della folla, della solitudine.

Sintomi a carico del SNP. Paralisi e paresi flaccida colpite le corna ant del midollo. Paralisi da paura. Paresi oculari e palpebrali. Poliomielite. Parkinson. Convulsivo. Disturbi psicosomatici dopo e per un'emozione. tremore, incoordinazione muscolare, vertigini, cefalea a insorgenza occipitale/cervicale.

Ipotensivo, ansia, continua astenia spossato con 37,2°C. Farmaco acuto e cronico.

Influenza ad esordio progressivo con debolezza e tremori..

TERAPIA

Gels : Vanno assunti già da 3 giorni prima dell'evento alla 30 CH, poi si associa **Gels** la sera prima e la mattina dell'evento alla 5 CH

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI

<http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html>

Dopo vaccinazione anti-difterite-tetano-pertosse.

Se debolezza e stanchezza. **Gels**. Anche anti-polio