

HECLA/HEKLA LAVA

(Hecla/Hekla)

COSTITUZIONE MUR-FOSF
DIATESI Forte LUES
COMPLEMENTARE/SINERGICO Nel LUES **Calc-p.** Nel MUR **Aur-m.**
COMPARARE con ■ **Sil, Merc, Phos.**

MENTALE Ipertesi. Irritabili. Dolore retro-sternale.

SINTOMI GENERALI Spine calcaneari (**Med, Bry** sfiamma, **Arn, Hekla**). Esostosi+ arti rattroppiti.

SINTOMI LOCALI

Ortopedia:

- dolori al ginocchio, tallone, spina calcaneare, alluce valgo;
- rachitismo degli arti inferiori;
- tumori ossei, osteiti, sarcomi;
- osteomalacia;
- apofisite tibiale anteriore di crescita (Osgood – Schlatter);

Odontoiatria

- carie dentarie precoci;
- tumori ossei della bocca benigni e maligni;
- ascessi, fistole, dolori dopo chirurgia dentaria, esostosi mascellari, paradontosi;
- necrosi del mascellare (azione elettiva sul canino);

ORL:

- sinusiti;
- poliposi nasale;
- osteite nasale.
- adenopatia latero-cervicale.

Genitale:

Disfunzione erettile [Agopuntura, Ginseng rosso coreano (Panax ginseng), Yohimbina, DHEA (deidroepiandrosterone), un ormone che è un componente essenziale per il testosterone, Ginkgo, L-arginina].

Altri campi:

- trombo-flebiti LUES;
- ripristina la secrezione lattea;
- dimagrimento nel bambino;
- micosi cutanee.

SINTESI CLINICA

MUR-FOSF/ forte LUES. Spine calcaneari (**Med, Bry** sfiamma, **Arn, Hekla**). Esostosi+ arti rattroppiti. Tumori ossei, osteiti, sarcomi. Osteomalacia. Carie dentarie precoci, tumori ossei della bocca benigni e maligni, necrosi del mascellare. Sinusiti, osteite nasale. Trombo-flebiti LUES. Ripristina la secrezione lattea. Disfunzione erettile.

NOTE

Il tropismo osseo di questo rimedio, messo in evidenza da **Wilkinson**, fu confermato da **Hering, Clarke** e da altri omeopati contemporanei che lo considerano uno dei principali rimedi in stomatologia, un vero "chirurgo omeopatico". Una lettera del 1870 di Wilkinson, poi pubblicata integralmente da Hering nei suoi "Guiding Symptoms", racconta: Gli effetti visibili sulle pecore e le mucche che vivono sulle pendici del vulcano sono **esostosi mascellari enormi**. Esse formano delle masse che sono facilmente separabili dall'osso sano. Le tumefazioni tendono ad ingrandirsi ed il loro colore è più scuro di quello dell'osso circostante. (...) In qualche caso nell'osso al di sotto della tumefazione si formano fistole che sboccano nel midollo osseo. (...)

Cabiers de biothérapie 171, agosto-settembre 2001, 29-34.