

IPECA o IPECACUANHA (Ip o Ipc)

KN :

Patologie intestinali con lingua sempre rossa e pulita

ETIOLOGIA

Collera

Collera	Acon, Cham (otite nei bambini, piangono con rabbia), Coloc (teso, arrabbiato), Ign, Ip (irritabile), Nux-v (Va spesso in collera), Plat (dopo gli incidenti nella paura di guidare), Staphy (collera trattenuta)
----------------	--

FISIOLOGIA

Vomito che non allevia la nausea, perché la nausea è di origine ormonale, infatti ha la **lingua pulita o poco impastata**, mantenuta umida dalla ipersalivazione. MOLTO VOMITO E POCA DIARREA.

Stimolazione vagale → ipersecrezione → vomito e la lingua è pulita Ip (lingua sporca **Ant-c** da disturbi intestinali).

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Cupr, Arn/ ---

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / Ars, Chin, Tabac.

COMPARARE

con : **Veratr.** Nell'asma **Blatta.** Nelle emorragie (ematemesi) **Ars, Cham, Puls.**

DD

Nux-v

AGISCE

Cura il vomito.

MENTALE

Desiderio di calunniare

MODALITÀ

Scialorrea tuttavia non avverte sete e non beve. Nausea con lingua pulita, vomito gravidico (**Tab, Cocc**), nausea che non migliora con il vomito.

Aggravamenti:

Inverno. Dopo mangiato. I vomiti aggravano (**Ip, Aeth, Ars, Ant-t**). Clima secco (**Hep, Alum, Caust, Ip, Nux-v, Spong**). Ore 11.

Avversioni:

Non sopporta la birra (coliche e nausea), carne di vitello (**Kali-n**). Frutta.

SINTOMI GENERALI

Diarree e vomiti. Gastroenteriti acute isolate. La diarrea generalmente autunnale quando notti fredde succedono a giornate calde, oppure si presenta dopo aver mangiato frutta verde. Le feci sono frequenti, fermentate, schiumose, verdastre o vischiose e più o meno sanguinolenti. Si accompagnano sempre a nausea e a vomiti molto abbondanti, vischiosi non alleviando in alcun modo il malato. Infine caratteristica essenziale: **la lingua resta pulita.**

Nausea e vomito in gravidanza con lingua pulita. Chinetosi con nausea e vomito.

Coniuntiviti allergiche [PSO/TUB edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrez] : soggetti vagotonici con coniuntiviti accompagnate da nausea con lingua pulita, alone bluastrò intorno agli occhi, complicanze corneali.

Disturbi della dentizione : Bambini che al momento della dentizione presentano nausea, vomito, inappetenza, diarrea, ma non sono nervosi. La stimolazione vagale provoca ipersecrezione e vomito con lingua pulita (lingua sporca **Ant-c** da disturbi intestinali).

SINTOMI LOCALI

Respiratorio:

Epistassi : Sangue rosso vivo. Nausea, vomito (che non allevia la nausea) (vagotonico → ipotensione).

Viso pallido. Aumento di tutte le secrez

Pertosse: Vomito con lingua pulita. Riflesso meccanico, non c'è componente digestiva.

Trachebronchiti acute con tosse secca o grassa senza espettoraz. Nausea o vomito. Rantoli.

Asma spasmodica

Asma bronchiale : PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO-SIC, a parte i CARB 80% Lach o Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph-i, Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc, Natr-s (SULF), Med, Lach (SULF/SIC-LUES)
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor (?)
Farmaci sintomatici	
Tosse e vomito con lingua pulita	Ip

Endocrinologia:

Acetonemia	
A)	1) Regolaz della dieta + Senn 5CH

	Crisi più frequenti nel bambino apparentemente asintomatiche, in cui la diagnosi viene fatta unicamente perché l'alito ha odore di frutta acida (spesso CARB)	2) Prevenzione + Senn 30 CH
	Nell' intervallo tra le crisi: Sequenza antipsorica di Kent: Lyc→Sulph→Calc	
B)	Crisi più gravi che insorgono bruscamente con vomito, febbre, cefalea, agitazione, spassatezza, crampi addominali, sudore freddo, collasso. Alito odore acetico, Corpi chetonici nelle urine. Intolleranza per i solidi e i liquidi; la crisi può durare dai 2 agli 8 gg.:	
		Ip 5 o 30 CH Diabete
	Se crampi addominali e coliche	Coloc, Cupr, Ars
	Se diarrea indolore e collasso	Veratr Farmaco di collassi
	Negli intervalli cicli di Kent	Lyc→Sulph→Calc

Diabete : **Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-ac, Lac-def stipsi, Lach, Lyc, Lycps, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent-h.**

Digerente:

Molto vomito e poca diarrea. Nausea di origine ormonale/neurologica. Nausea e vomito gravidici. Alitosi con **lingua pulita** (Fortakel, Porfakel). Anche solo da acetone: prime ore del giorno **Puls**, tutto il giorno **Bapt**.

Prevenzione della nausea. **Ip** è il primo rimedio a cui pensare, scialorrea, lingua pulita nonostante la tendenza alla nausea e vomito

Lingua: Sempre rossa e pulita. Intensa salivazione (scialorrea LUES, anche **Merc**) ed assenza di sete. Nausea e vomito: **Ip** (indolore).

Rigurgito. (è occasionale, di piccole dimensioni e viene provocato da un cambio repentino della posizione corporale o da una pressione involontaria sull'addome, del neonato/bambino).

Digestione difficile.

Vomito, nausea e scariche diarroidiche con tenesmo, fermentanti, di colore verde, schiumose e talvolta sanguinanti con lingua pulita, che non alleviano in alcun modo il malato.

Diarrea

DIARREA	
Diarrea provoca sollievo: Abrot, Natr-s, Zinc	
Terapia generica delle diarree. Antidiarroico R4	Si dà Ars (perché nelle diarree c'è sempre putrefazione delle proteine), se c'è nausea si dà Ip , se dopo 2 ore non hanno funzionato si dà Podo (farmaco della colecisti) che funziona in 2 ore. Si possono dare insieme Ip, Podo, Veratr .

La diarrea generalmente autunnale quando notti fredde succedono a giornate calde, oppure si presenta dopo aver mangiato frutta verde. Le feci sono frequenti, fermentate, schiumose, verdastre o vischiose e più o meno sanguinolenti.

Diarrea con nausea: (**Aloe, Ant-c, Ars, Bis, Chin, Colch, Cupr, Ip, Mag-c, Veratr**).

Nausea e vomito gravidici.

Colon irritabile

Uno dei farmaci della colite ulcerosa

COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustraz → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy

Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja			
	Ars			
	Arg-n			
	Lach	ad alte diluizioni		
	Lyc			
	Staphy			
	Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Rhus-t - Complementari:				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi i nosodi : Lues, TK, Med				

Oncologia:

Trattamento dei disturbi digestivi, in particolare quelli legati alla chemioterapia. Per la scelta di questi rimedi è molto importante l'osservazione delle modalità di manifestazione dei sintomi e l'aspetto della lingua del paziente.

Vomiti. Dopo chemio o radio. Nausea con lingua pulita che non migliora con il vomito; salivazione abbondante: **Ip**.

Altri disturbi digestivi : **R7** cp, **Nux-v**, **Ip** (lingua pulita), **Cisplat** (se utilizza il cisplatino)

SINTESI CLINICA

- MOLTO VOMITO E POCA DIARREA. Vomito che non allevia la nausea, perché la nausea è di origine ormonale, infatti ha la **lingua pulita o poco impastata**, mantenuta umida dalla ipersalivazione. **Stimolaz vagale → ipersecrez → vomito e la lingua è pulita Ip** (lingua sporca **Ant-c** da disturbi intestinali).
Scialorrea, ma il paziente non avverte sete. Scariche diarroiche con tenesmo, fermentanti, di colore verde, schiumose e talvolta sanguinanti. Nausea e vomito gravidici.
- Asma bronchiale spasmodico.

NOTE

Diarrea e vomito **R4**