

LAC CANINUM

(Lac-c)

KN : La paziente camminando deve sostenere le mammelle per evitare il dolore (come Bry)

EFFETTI INDESIDERATI Contro-indicato in allattamento.

COMPARARE con : Lach, Con.

MENTALE Eccitazione paura ↔ Depressione con tristezza e pianti.
Sogna di serpenti (Lac-c, Arg-n, Lach).

MODALITÀ

Periodicità (caratteristica PSO): Aggrava ogni 2 gg.

Lateralità Sintomi con alternanza di lato.

Avversioni: Latte

SINTOMI GENERALI

- Labbra secche e desquamanti
- Dolore alternante tra dx e sn, in qualunque parte del corpo. Eemicranie con dolori che si alternano di lato, frequentemente durante la stessa crisi. Cefalee migranti.
- Brividi solo su metà del corpo, una guancia rossa l'altra pallida (Puls, Cham, Acon).
- Serve per interrompere l'allattamento.
- Ipertensione.

Ipertensione può essere SIC o LUES	
L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES: Sulph, Nux-v, Aur, Plb, Lyc)	
Farmaci vascolari LUES: Acon, Ars, Aur (sclerosi vascolare), Plb	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur, mentre per la SIC è Natr-s che ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi : Arg-n, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Kali-c, Lac-c, Lyc, Meli, Naja, Natr-m, Sang, Stront	

SINTOMI LOCALI

Infettivologia

Difterite	
Laringite difterica	Diph
Laringite difterica ricaduta	Acet-ac, Phos
Apis 30 CH, Merc-cy, Lac-c	

Respiratorio: Faringo-tonsilliti con dolore alternante di lato.

Ginecologia: Sindrome premestruale:

- Cefalee migranti a lateralità variabile durante la stessa crisi in fase premestruale. Con disturbi digestivi.
- Mastopatia fibro-cistica. Mammelle tumefatte, gonfie dolorose sensibili al tatto e alla minima scossa (movimento) (Calc, Puls, Lac-c o Lac-def nel diabete, Phyt) che s'irradia alla schiena. La paziente camminando deve sostenere le mammelle per evitare il dolore (come Bry). Dolore che passa da una mammella all'altra.

Allattamento abbondante secrezione lattea che può avere aspetto caseoso.

SINTESI CLINICA

Dolore alternante tra dx e sn. In qualunque parte del corpo (faringo-tonsilliti).

Cefalee premestruali, mastopatia fibro-cistica con mammelle tumefatte, gonfie dolorose.

Serve per interrompere l'allattamento. Ipertensione.

NOTE Rimedi per le mastiti acute in veterinaria: Bell, Phyt, Apis, Bry, Pyrog, Lac-c, Con.