

LAC DEFLORATUM

(Lac-def)

COMPARARE

con : **Natr-m.**

Alternanze:

Cefalea compare spesso dopo doversi giorni di stipsi.

SINTOMI GENERALI

Diabete.

Diabete
Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-def , Lac-ac, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent-h

Intolleranza al latte. .. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO		
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea		
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓				↓		
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c		
				Ant-c Fegato sovraccaricato		
↓				↓		
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔↔	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
↪	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).					↪
		↓				
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				
AA aggiungono						
Lac-def,	Diabete. Latte scarso o assente, donna depressa. Intollerante al latte e senza latte. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure. Ristabilisce la secrezione.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, , Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy						

SINTOMI LOCALI

SNC: Cefalee con disturbi digestivi. Eemicranie e cefalee degli stitici. Cefalee migranti (tutti i latti). Dolori che iniziano dalla fronte e s'irradiano all'occipite (il contrario di **Gels**). Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati.

Ginecologia: Mastodinia **Puls, Calc, Lac-c** (o **Lac-def** nel **diabete**), **Phyt**.

SINTESI CLINICA

Allattamento ■ latte scarso o assente, donna depressa. Intollerante al latte e senza latte, **Lac-def** ristabilisce la secrezione. Cefalee con disturbi digestivi che compare spesso dopo diversi giorni di stipsi.. Diabete.