

LATRODECTUS MACTANS Ragni

(Lat-m)

(vedova nera – grosso ragno del Cile)

Veleni dei ragni (tutti LUES) :

SPASMI (ECCITAZIONE, CONVULSIONI), NEVRALGIE, EMORRAGIE, IRRITANTI LE MUCOSE, DIARROICI

FISIOLOGIA

Lat-m è più efficace di **Glon**.

SINTESI CLINICA

Infarto nelle prime ore/angina pectoris. Specie necrosi postero-inferiori. Dolore precordiale assai violento. Crampi gastrici, polso filiforme, stato sincopale.

Caso clinico:

Puntura al prepuzio:

dolore nella sede della puntura, dolori precordiali ed al braccio sn,
apnea,
vomito nero, **melen**.

NOTE

Il morso del ragno vedova nera [**Lat-m**] potrebbe causare una sindrome detta 'latrodectismo'.

Wikipedia : Il **latrodectismo** è la sindrome causata dal veleno neurotossico (latrotossina) iniettato dal morso di ragni che fanno parte del genere *Latrodectus*, della famiglia Theridiidae.

Il veleno si diffonde rapidamente in tutto il corpo, causando il rilascio dei neurotrasmettitori acetilcolina, noradrenalina e GABA. Il rilascio di questi neurotrasmettitori porta alla manifestazione clinica dell'avvelenamento.

Fase di esacerbazione: Nelle prime 24 ore successive al morso si ha :

- Forti dolori muscolari locali, nella zona del morso
- Crampi muscolari, principalmente all'addome, schiena e cosce
- Mal di testa, vertigini, tremori, salivazione eccessiva, sudorazione eccessiva, nausea e vomito
- Ansia, insonnia, affaticamento
- Tachicardia, bradicardia, irrequietezza, ipertensione, iperventilazione

Fase di dissipazione: Dopo 1 - 3 giorni dal morso, i sintomi iniziano a scemare.

Fase residua: Durante le settimane e i mesi seguenti al morso: Spasmi muscolari, formicolio, nervosismo e debolezza.