

LATTASI

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)					
Patologie più gravi scendendo verso il basso					
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO	
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.	
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc				
↓				↓	
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c	
				Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓				↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano ↓	↔	Carb-v Eruttazioni che migliorano ←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi ↓	
↪	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				↩
		↓			
Componente esagerata LUES	Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
	Bapt				
	Veratr				
	Camph				
	Cupr				
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy					