

LAUROCERASUS

(Laur)

Cianosi-scompenso cardiaco-anasarca (**Ars**, **Apoc**)

KN : La sensazione come se il cuore SI STESSE FERMANDO a seguito di un minimo movimento, cosicché tendono a rimanere immobili nel letto.

COMPARARE con : Hydr-ac, Camph, Sec, Am-c, Ambr.

MENTALE Depressione. Mancanza di reazione.

Mancanza di reazione
Carb-v, Laur , Mosch, Op, Sulph, Nosodi : Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja

MODALITÀ

Aggravamenti: Patologie toraciche peggiorate da distesi (**Psor**, **Laur**). Con un minimo esercizio.

SINTOMI LOCALI

Respiratorio: Tosse con disturbi cardiaci. Tosse parossistica e oppressione. Il malato porta costantemente le mani al cuore, stando coricato. Dispnea. Cianosi delle narici (cianosi centrale o respiratoria). Dita a bacchetta di tamburo.

Cardiologia: Scompenso cardiaco. Bradicardia o tachicardia a conduzione ridotta. Il cuore è dilatato, ipertrofico. Edemi da stasi, fino all'edema polmonare, anasarca. Cianosi delle estremità (cianosi periferica o da rallentamento del circolo).

Oncologia: Tra i rimedi antineoplasia in atto. Altri : Hydr-ac, **Laur**, Carb-ac, Acet-ac, Tart-ac.

SINTESI CLINICA

Scompenso cardiaco. Bradicardia o tachicardia a conduzione ridotta. Il cuore è dilatato, ipertrofico. Edemi da stasi, fino all'edema polmonare, anasarca. Cianosi delle estremità (cianosi periferica o da rallentamento del circolo).

Tosse con disturbi cardiaci, parossistica. Dispnea. Cianosi delle narici (cianosi centrale o respiratoria). Dita a bacchetta di tamburo. Depressione. Mancanza di reazione.

TERAPIA/DOSE

SCOMPENSO CARDIACO
risposta rapida con 30 CH ogni 15 min. se il rimedio è giusto migliora alla II° somministrata → ogni 30 min, se migliora ancora → ogni 30 min → ogni ora (come nelle coliche e come nell'asma) (come Dig)