

MAGNESIA CARBONICA

(Mag-c)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

E' il farmaco della **DIATESI ACIDA** (come **Calc, Hep**). Si traduce in una acidità e in un odore acido di tutte le secrezioni e di tutte le escrezioni. I fenomeni d'irritazione delle vie digestive superiori si accompagnano a disturbi intestinali e a diarrea. Le feci sono acide, verdastre, acquose, schiumose come uova di rana. La pelle è secca, giallastra, incartapecorita ed emana da tutto il corpo un odore acido molto caratteristico

Diarrea (tutte le magnesie)

KN : **È il farmaco delle diarree da intolleranza al latte. Farmaco della diatesi acida.**

COSTITUZIONE CARB-SULF

DIATESI PSO

FISIOLOGIA I CARB sono intolleranti al latte

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Cham/ Calc, Hep, Lyc, Rheum, Lach** (ipomenorrea), **Cham e Coloc** (nevralgie).

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Ars, Merc, Nux-v.**

COMPARARE con : **Rheum, Kreos, Aloe, Cheir.**

DD

DIARREA Magnesie Tutte le Magnesie (nevriti) migliorano con il caldo. Poco riposate al mattino Capelli deboli e opachi, dolore a sn ed ai gomiti (Magnesie, Iod). Disturbi da rabbia (Magnesie, Iod)		
Carbonica	Muriatica	Phosphorica (acuto Coloc)
Atopia, intolleranza al latte, diarree dei diabetici CARB . Diarrea acquosa acida, verde e schiumosa dei lattanti con sudorazione acre	Diarrea, stipsi , intolleranza al sole, non gradisce il mare, depresso. Riequilibrante. Escludere la Celiachia (Chin).	Diarree dei diabetici FOSF (Coloc del FOSF). Sindromi gastro-enteriche debilitanti, diarree, diabete giovanile , emaciato. Accessi irregolari di dolori crampoidi con il malato che si piega in due e con feci diarroidiche e flatulenza

Cham stizzoso, bisbetico si calma se preso in braccio,

Acon (dolori intensi), ma da freddo. Paziente SULF congesto, pletorico con paura della morte.

Ars (dolori) ansia, paura della morte.

Coloc dolori crampoidi.

AGISCE SN, muscoli, succhi pancreatici esocrini ed endocrini, agisce sulle ghiandole (ovaie), facilita la fagocitosi leucocitaria. Azione anticancerosa.

MENTALE Triste (Carbonio), irritabile (Magnesio)
Senso del dovere : tutte le **Magnesie** (peggio **Mag-m**), **Carc, Kali-c, Aur.**
Non tollera i litigi. Odiano le liti e l'aggressività. Individui pacificatori.

Sono aggressive stizzose, imprevedibili. **PERDITA:**

Mag-c : abbandonato dagli amici e dalla famiglia.

Mag-m : non ha amici.

Disturbi da rabbia (**Mag-c, Iod**).

Ansia durante il giorno che migliora la sera a letto. Ansia con tremori. Spossatezza la mattina al risveglio.

Insonnia verso le 3 del mattino (aggravamento) senza potersi riaddormentare.

Sogni di ladri (), di fuoco ().

MODALITÀ

Aggravamenti:

Con le correnti d'aria alla schiena.

Prima e durante le mestruazioni.

Aggravano durante le mestruazioni
Act-r, Am-c, Arg-n, Bell, Cocc, Con, Graph, Hyosc, Kreos, Mag-c, Plat, Puls, Sep, Sil, Veratr, Vib-o, Zinc

Con i cibi caldi.

Collera (**Bry, Cham, Coloc, Iod, Lyc, Nux-v, Staphy, Magnesie**).

Alle 3 di notte (**Am-c, Ant-t, Baryta, Bry, Cupr, Kali-c, Mag-c, Nux-v, Thuja**) o dalle 3 alle 4.

Miglioramenti:

Con il calore (tutte le magnesie migliorano le nevriti con il caldo).

Con la pressione locale in caso di dolori addominali.

Stando all'aria aperta.

Non isterici > all'aria aperta	Acon, All-c, Alum, Alum-p, Alum-s, Ant-c, Apis, Arg-n, Baryta, Cact-c, Clem, Dig, Dros, Gels, Glon, Iod, Lach, Lyc, Mag-c , Natr-m, Puls, Sabad, Sep, Sulph, Tab
-----------------------------------	---

Periodicità (caratteristica PSO): Aggrava ogni 3 settimane.

Alternanze: ---

Lateralità: sn

Avversioni: Frutta → diarrea (come **Kali-c** e gli arsenicali). **Vomita il latte appena ingurgitato che è acidissimo.**

Avversione al latte (fa male)
Sep, Natr-m, Natr-c, Mag-c, Sil non tollera il latte, Lac-c . Bevono poco latte i CARB (Calc), Aeth, Ant-t, Brom, Carb-v, Chin, Puls, Sulph

Desideri: Carne, pane, burro, verdure

SINTOMI GENERALI

Bambino

Intollerante al latte : **Aeth** (Più vomito), **Mag-c** (Diarrea acida), **Sil** (Latte materno), **Natr-p, Sep**. La più prescritta per l'intolleranza al latte/crosta latte. Vomita il latte appena bevuto che è acidissimo (bambino CARB, Magnesie).

Rigurgito del latte il bambino non cresce **Mag-c**. **R4**. I bambini CARB ed i **Mag** vomitano il latte appena bevuto che risulta acidissimo

<u>Magrezze da malassorbimento intestinale</u>
Diarrea acquosa acida, verde e schiumosa dei lattanti con sudorazione acre ed intolleranza al latte.
Mag-c

Coliti. Diarrea del lattante (intolleranze al galattosio, eruzioni dentarie), emana odore acre da tutto corpo: Diarrea acquosa, verde, schiumosa prolungate e spossanti. **È il farmaco delle diarreie da intolleranza al latte.**

Escludere la celiachia che è curata da **Chin**

Adulto

È il farmaco della diatesi acida.

Intolleranza al latte.

DIARREA (**Aloe, Ant-c, Ars, Bis, China, Colch, Cupr, Ip, Mag-c, Veratr**) dopo il latte, **dei diabetici CARB.**

Afte dolorose alle guance, la lingua e le labbra.

I fenomeni d'irritazione delle vie digestive superiori si accompagnano a disturbi intestinali e a diarrea. Le fece sono acide, verdastre, acquose, schiumose come uova di rana.

La cute è secca, giallastra, incartapecorita ed emana da tutto il corpo un odore acido molto caratteristico.

Mattino è poco riposato.

Obesità

OBESITA'
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Mag-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

Dolore a **sn** ed ai gomiti, nevralgico, a crampo come coltello. Ipersensibilità al dolore.

Sindrome da stanchezza cronica (CARB)

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri		Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea
		Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc		
↓				↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c
				Ant-c Fegato sovraccaricato
↓				↓
Adulto				

Natr-m Autismo, adorazione per la madre		← →	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).				←ℑ	
		↓				
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				
AA aggiungono						
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, , Guaj, Hom, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Staphy						

SINTOMI LOCALI

<u>Testa:</u>	<u>Capelli</u> deboli e opachi. <u>Afte</u> dolorose alle guance, la lingua e le labbra.
<u>SNC:</u>	<u>Nevralgia</u> <u>sn</u> del trigemino <u>Vertigini</u> rotatorie alzandosi da alterazione distonica dell'equilibrio simpatico-parasimpatico. Emotivo.
<u>Cardiovascolare:</u>	Coronaropatia arteriosclerotica con <u>angor</u> da spasmi (Cupr , Coloc , Mag-c) complicato da patologia digestiva (Nux-v).
<u>astrointestinale:</u>	Lenta digestione. Costipazione. Colon irritabile (anche nei bambini). Colica addominale. Diarrea acida verdastra, feci schiumose come uova di rane. Diarree dei diabetici CARB. Epatite NON virale. CARB, Mag-c .
<u>Ginecologia:</u>	È stata utilizzata nella terapia della sindrome premestruale e delle dismenorree. Mestruazioni in ritardo, poco abbondanti, brevi. Sangue spesso, nero come pece. Flusso mestruale che insorge la notte o stando coricata, cessa durante il giorno quando la malata cammina. Dolori acuti, nevralgici, bruschi ◀ di notte, forzando la malata ad alzarsi e camminare, ◀ a sinistra. Diarrea durante le mestruazioni (Plat , Mag-c).

Diarrea provoca sollievo: **Abrot, Natr-s, Zinc**

SINTESI CLINICA

È il farmaco della DIATESI ACIDA. Si traduce in una acidità e in un odore acido di tutte le secrezioni e di tutte le escrezioni. I fenomeni d'irritazione delle vie digestive superiori si accompagnano a disturbi intestinali e a diarrea. Le feci sono acide, verdastre, acquose, schiumose come uova di rana. **È il farmaco delle diarree da intolleranza al latte.** La pelle è secca, giallastra, incartapecorita ed emana da tutto il corpo un odore acido molto caratteristico. Dolori nevralgici. Flusso mestruale che insorge la notte o stando coricata, cessa durante il giorno quando la malata cammina
BAMBINO Intollerante al latte, crosta latte. Diarrea acida

PATOLGIE Blocco dello sviluppo. Coliche. Costipazione. Epatite. Gravidanza. Insonnia. Nevralgia (CARB).

Sindrome da stanchezza cronica (CARB)

PUNTO DI WEIHE Parte interna del bordo superiore dell'arcata sopraorbitaria dx.

TERAPIA/DOSE Antidiarroico **R4**