

MEDUSA Mare

(Medus)

Tutti gli animali marini sono sodici, mentre **Natr-m** è solo per i MURCute: Orticaria o erisipela del viso e del collo con edema.Mammelle: Lattazione scarsa e anomala (anche **Ric**)

ALLATTAMENTO	
Improvvisa agalattia dopo esposizione a freddo secco, con forte ansietà.	Acon
Secrezione lattea abbondante, il seno rosso, caldo, duro, gonfio, molto dolente. Agalattia dopo forti dispiaceri o in seguito a mastiti insorte improvvisamente.	Bell
Possibile interruzione della secrezione lattea, che può essere anche abbondante, dopo forti dispiaceri, mastiti che insorgono lentamente.	Bry poi Phyt
Latte scarso, molto denso e di cattivo sapore. Durante la suzione dolore all'altro seno. Afte. Sta male nei movimenti di discesa.	Borx
Assenza o scarsità di latte nonostante il seno sia disteso, il latte può avere cattivo sapore, essere acquoso. Oppure il latte è troppo abbondante ma poco nutriente e può scolare spontaneamente.	Calc
Latte abbondante fluido, piuttosto salato, acido. Insoddisfatte. Amano viaggiare.	Calc-p
Soppressione della secrezione lattea dopo una collera o un forte dispiacere in una donna molto irritabile <u>con marcata intolleranza al dolore</u> → collera.	Cham
Latte abbondante, astenia spiccata con ronzio alle orecchie. Allattamenti prolungati, perdita di liquidi.	Chin
Soppressione della secrezione lattea dopo esposizione prolungata al freddo umido.	Dulc
Agalattia dopo processi suppurativi delle mammelle con tendenza alla formazione di cicatrici dure e dolorose. Capezzoli screpolati e assai dolenti. Ragadi del capezzolo.	Graph
Soppressione della secrezione lattea dopo processi suppurativi delle mammelle, con dolori pungenti come da scheggia	Hep
Latte abbondante e filante	Kali-bi
Secrezione di latte abbondante che può avere aspetto caseoso. Depressione con tristezza e pianti. Sintomi con alternanza di lato. Sogna serpenti.	Lac-c
Latte scarso o assente, donna depressa. Intollerante al latte e senza latte.	Lac-def ristabilisce la secrezione
Latte abbondante e giallastro. La suzione provoca intensi dolori, ragadi ai capezzoli, seno duro e dolente, l'infiammazione può arrivare all'ascesso.	Phyt
Latte scarso acquoso povero. Agalattia dopo che la donna si è bagnata i piedi con acqua fredda. Si può alternare ipergalattorrea. Il latte può scolare spontaneamente.	Puls
<u>Stimola</u> la secrezione: a 5 CH + Agn 5 CH. Montata lattea. Anche + Medus	Ric
<u>Inibisce</u> la secrezione a 30 CH x 3 gg	
Secrezione abbondante che può essere soppressa dopo che la donna ha preso freddo o si è bagnata i piedi.	Rhus tox
Indicato subito dopo il parto, quando sono presenti dolori brucianti alle mammelle, migliorati da applicazioni fredde (contrario di Ars applicazioni calde). Arteriti.	Sec
Indicato in particolare quando c'è <u>dolore dorsale</u> durante l'allattamento. Ci può essere sangue nella vagina mentre il bambino succhia. Il latte può scolare spontaneamente. Longilinee.	Sil
Quando c'è <u>dolore lombare</u> durante l'allattamento	Kali-c
Quando la secrezione lattea non compare affatto o scompare. Il latte è scarso nonostante le mammelle siano gonfie.	Urt-u

Urinaria: Diuretico.**SINTESI CLINICA**

Orticaria o erisipela del viso e del collo con edema. Diuretico. Lattazione scarsa e anomala (stimola la secrezione).