

NAJA TRIPUDIANS Serp Colubridi (Naja)

KN :	Impulso improvviso al suicidio, da raptus ansioso/ossessivo, a ciel sereno
DIATESI	LUES vascolare (Tutti i Serp) (paura del contagio che porta alla morte).
FISIOLOGIA	Neurotossico - Emorragico
COMPLEMENTARE/SINERGICO	Ars.
EFFETTI INDESIDERATI	Pericolo di emorragie (come gli altri veleni di serpenti, TK, Phos), per cui si inizia con 9-15 CH.
COMPARARE	con : Lach, Crot-h, Spig, Spong.
DD	Situazione cardiologica più grave rispetto a Lach .
AGISCE	Azione sul SNC e SNP. Patologie vascolari.
EVOLUZIONE	Sulph → Nux-v → Ign → Aur (autodistruttivo) → Lach / Crot-h (più avanzato di Aur) → Naja → Plb → Baryta

COLUBRIBI - NEUROTOSSICI - EMORRAGICI	
Naja	Pericarditi
Elaps	Meno importante
VIPERIDI - EMORRAGICI - COAGULANTI - NECROTIZZANTI (antisuppurativi)	
Lach	
Both	
Crot-h	
Cench	dx. Tra Lach ed Ars .
Vip-a	Fluidificante preventivo delle tromboflebiti

MENTALE Irritabilità per un nonnulla. Depressione in cardiopatico. Desiderio e sogni di suicidio (come **Aur**).

MODALITÀ

Aggravamenti:

- Freddo.
- Bevande stimolanti (**Glom, Naja, Nux-v, Op, Sulph, Zinc**).
- Di notte (LUES)
- Dopo il sonno, al risveglio (**Apis, Apoc, Coc-c, Lach, Mag-m** al mattino è poco riposato, **Mur-ac, Naja, Op, Sel, Spong**).
- Durante le mestruazioni (dolore ovaio **sn**).

Lateralità

sn

SINTOMI GENERALI Prevalentemente cardiologici (VEDI sotto). Situazione cardiologica più grave di **Lach**. Prevenzione degli stati emorragici.

SINTOMI LOCALI

SNC:

Cefalea congestizia e battente.

Cardiologia:

Angor spontaneo e angor spontaneo notturno: Dolore violento costrittivo irradiato al braccio **sn**, ad ambedue le braccia, al dorso, alla nuca. Peggior col minimo sforzo e parlando, di notte. Paura di morire senza agitazione. Vampate. Oppressione toracica, tosse, costrizione in gola (**Ign, Lach**). Tachicardia costante.

Angor spastico da freddo (**Ars, Lach, Naja, Hydr-ac**).

Angina instabile con estensione della crisi anche di notte.

Infarto nelle prime ore con insufficienza acuta del vn **sn** (**Naja**)-Polso ritmico, talvolta extrasistoli.

PERICARDITE anche pregressa insieme a **Kali-m** (aspetti fibrinosi) 9 -15 CH.

Vasculite.

Iperensione.

IPERTENSIONE ARTERIOSA	
Iperensione può essere SIC o LUES	
L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES: Acon, Ars, Sulph, Nux-v, Aur sclerosi vascolare, Plb	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s	
Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi	Arg-n, Baryta, Bell, Cact, Carb-v, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glom, Ign, Kali-c, Lach, Lac-c, Lyc, Med, Meli, Naja, Natr-m, Nux-v, Op, Phos, Sang, Stront, Thuja

Respiratorio: Tosse di origine cardiaca con sensazione di strangolamento e soffocamento (**Spong**), < per un movimento o uno sforzo.. Tachicardie costanti che impediscono al malato di parlare. Dolori cardiaci intensi che s'irradiano alla nuca e al braccio sinistro, con sensazione di morte prossima.

Linfatico: Edema soffice trasparente diafano. Sempre **post-pericardite**.

Urogenitale: Polluzioni notturne. Leucorrea pomeridiana. **Dolore all'ovaio sn** che si irradia fino al cuore.

Reumatologia Artrite reumatoide **post-endocardite** (LUES).

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciettello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Oncologia: Rimedi anti neoplastici specifici per tumori dello stomaco, utero e cervice (**Naja**, **Elaps**, **Lach**).

SINTESI CLINICA

LUES vascolare (Tutti i Serp) (paura del contagio che porta alla morte). Irritabilità per un nonnulla. Depressione in cardiopatico. Desiderio e sogni di suicidio (come **Aur**).

Cefalea congestizia e battente.

Patologie vascolari: Angor spontaneo e notturno. Sensazione di strangolamento e soffocamento (**Spong**). Tachicardia costante. Angor spastico da freddo, angina instabile. Infarto nelle prime ore con insufficienza cardiaca acuta. Extrasistoli. Pericardite. Vasculite. Ipertensione. Situazione cardiologica più grave di **Lach**.

Anti-neoplastico specifico per stomaco, utero e cervice uterina.

Pericolo/Prevenzione delle emorragie (come gli altri veleni di serpenti, **TK**, **Phos**), per cui si inizia con 9-15 CH.

TERAPIA/DOSE Come preventivi alla 15 CH – in fase acuta 5 CH più volte al giorno (sempre i serpenti)

NOTE Poco usato.