

OPIUM (Op)

KN :
COSTITUZIONE
ETIOLOGIA

Assenza di dolori malgrado la gravità dei sintomi.

SULF pletorico.

Ictus, incidenti, traumi alla testa, operazioni chirurgiche, shocks. Vapori di carbone, inalazione di gas. Alcolisti

Emozioni

Op : Spasmi dei BAMBINI da approccio di estranei, da infermieristica, dopo spavento della madre, da pianto con occhi semiaperti e rovesciati.

Op stipsi, soglia del dolore alta, spavento, cattivi effetti della paura che persistono

Calc, Gels, Ign, Arg-n, Lach, Anac (indeciso, obeso – mangia ma non vorrebbe – tratta bene coloro che non stima, si devono mettere alla prova), **Acon** (dopo gli incidenti nella paura di guidare),

FISIOLOGIA

Mentre il farmaco delle paure è **Acon**, **Op** ha subito qualcosa il cui ricordo è vivissimo per cui presenta i sintomi come diarrea e convulsioni [**spavento + crisi epilettica o aborto**].

Quindi produce una grande agitazione (come **Arn**).

È anche farmaco dell'**ictus cerebri + paresi e miosi + faccia rosso-scura**.

INCOMPATIBILE / ANTITODO --- / Avvelenamento Acuto : **Atro**. Cronico : **Ip, Nux-v, Passi, Berb.**

COMPARARE con : **Apis, Bell, Gels, Nux-m, Esch.**

AGISCE Mente. SNC, SNP e SN simpatico. Nervi (cerebrali e cerebro-spinali). Fibre sensoriali.

Ventilazione polmonare.

Tratto digestivo.

MENTALE

Sempre sonnolento o in stato di torpore. Non soffre, non si lamenta, non desidera nulla.

Terrorizzati la notte da presenze oscure, ragni. Alcolismo, deliro acuto, panico, impaurito, sudato, suoni di campane in lontananza.

Visioni terrificanti Sogni libidinosi ().

<u>Bugiardo</u>	Puls, Sulph, Veratr, Op.
-----------------	---------------------------------

Mancanza di reazione

Carb-v, Laur, Mosch, Op, Sulph.
--

Nosodi : Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja.
--

MODALITÀ

Sete intensa

Aggravamenti

Dopo emozioni, forti emozioni, paure, spaventi.

Peggiorano con la paura

Acon, Gels, Ign, Op, Veratr

Alcool. Bevande stimolanti (**Glon, Naja, Nux-v, Op, Sulph, Zinc**).

Eruzioni sopresse.

Calore, con il caldo del letto (**Cham, Dros, Led, Merc, Op, Plat, Puls, Sabin, Sec, Sulph**).

Sudando (**Bell, Cham, Hep, Merc, Nux-v, Op, Phos-ac, Stram, Sulph, Veratr**).

Durante e dopo il sonno (**Apis, Apoc, Coc-c, Lach, Mur-ac, Mag-m** al mattino poco riposato, **Naja, Op, Sel, Spong**).

Miglioramenti:

Con il freddo (**All c, Aloe, Apis, Glon, Iod, Led, Lyc, Op, Phos, Sec, Aesc** rimedio venoso),

All'aria aperta.

Camminando.

Avversioni:

Alcolici (**Ars, Cann-i, Lach, Nux-v, Op, Ran-b, Sel, Stram, Sul-ac, Alum**).

SINTOMI GENERALI

Assenza di dolori malgrado la gravità dei sintomi.

Tutti gli stati morbosi che si accompagnano a sonnolenza o a sonno profondo, insensibile a ciò che lo circonda (oppure audace e spericolato in modo irragionevole). Il malato non soffre, non si lamenta, non desidera niente. Torpore profondo con respirazione stentorea e perdita di conoscenza. Talvolta sonnolento, assopito ma non può dormire (**Bell, Cham**).

Astenia generale si isola in sé stesso, stato di abbattimento.

Stato stuporoso, coma.

Atonia intestinale.

Paralisi parziali o complete
Desiderio costante di essere scoperto.

SINTOMI LOCALI

Facies:

Grande sonnolenza

Volto rosso, caldo, congestionato, cianotico, coperto da sudori caldi. Contrazioni fibrillari dei muscoli della faccia, < agli angoli della bocca. Estremità fredde.

<u>Naso affilato</u>
Ant-t asmatico, Ars, Mur-ac, Op , Pyrog, Veratr colera

<u>Labbra</u> bluastre o cianotiche
Ars-i, Dros, Kalm,
Carb-a, Carb-v, Cupr, Lach
Op 9-15 CH
Elimina azione tossica dell'anestetico sull'intestino
Tossicodipendenze
Stati soporosi
situazioni gravi

<u>Lingua</u>
Scura violacea paretica o paralitica
Scura fessurata sanguinante
Op Sec

Mandibola cadente Sonno profondo o torpore con respirazione stentorea e incoscienza. Desiderio costante di essere scoperto. Atonia intestinale

SNC

Parestesie acustiche, depressione fisica e mentale.

Spasmi dei bambini da approccio di estranei, da infermieristica, dopo spavento della madre, da pianto con occhi semiaperti e rovesciati

Paralisi parziali o complete o insensibilità da spavento, da cattivi effetti della paura che persistono; da vapori di carbone, da inalazione di gas; di alcolisti.

PARALISI Vannier
Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op , Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

Ictus cerebri.

Cardiologia

Ipertensione

RIASSUNTO	
IPERTENSIONE ARTERIOSA	
Ipertensione può essere SIC o LUES	
L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES: Acon, Ars, Sulph, Nux-v, Aur sclerosi vascolare, Plb	
L'ipertensione nel SIC : Obesità + imbibizione → SIC → ipertensione : Natr-s, Thuja, Med	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur, mentre per la SIC è Natr-s	
Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi	Arg-n, Baryta, Bell, Cact, Carb-v, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Ign, Kali-c, Lach, Lac-c, Lyc, Meli, Naja, Natr-m, Op , Phos, Sang, Stront

Vertigini di origine vascolare alzandosi specialmente nei post-operati, senso di ebbrezza "cannabinoidi".

Tendenza congestizia con polso lento e pieno.

Respiratorio:

Russatore, OSAS

Soffoca appena si addormenta si risveglia con un soprassalto. Respirazione rumorosa, rapida, stentorea e profonda. Tendenza congestizia con polso lento e pieno. Sonnolenza diurna.

Faccia rossa, calda, ricoperta di sudori caldi, estremità fredde.

Patologia polmonare con paralisi diaframmatica (**Cupr** 200 CH, **Op** o **Sil** 200 CH).

Digerente

Atonia intestinale ed inerzia rettale con assenza di stimolo. Neurogeno, stato paretico della muscolatura liscia intestinale. Stipsi ostinata (**Aloe**, **Bry**, **Caust**, **Lyc**, **Nux-v**, **Sep**, **Sulph**, **Op**) anziani post-intervento chirurgico, post-chemio. Feci dure, fecalomi neri, espulsi solamente con un lavaggio.

Le materie non possono essere evacuate, escono e rientrano alternativamente. (**Calc** : stitico senza colite)

Stipsi (**Aloe**, **Bry**, **Lyc**, **Nux-v**, **Sep**, **Sulph**, **Op**).

Ginecologia

Prevenzione dell'aborto.

SINTESI CLINICA

SULF pletorico. Ha subito qualcosa il cui ricordo è vivissimo per cui presenta i sintomi come diarrea e convulsioni [spavento + crisi epilettica o aborto]. Quindi produce una grande agitazione (come **Arn**). È anche farmaco dell'ictus cerebri + paresi e miosi + faccia rosso-scura. Agisce sulla mente, sensi, SN simpatico, nervi (cerebrali e cerebro-spinali). Sui polmoni, sulla respirazione e sul tratto digestivo.

Terrorizzati durante notte, astenia generale, grande sonnolenza, stato stuporoso. Obstructive Sleep Apnoe Syndrome. Atonia intestinale.