

PICRICUM ACIDUM

(Pic-ac)

FISIOLOGIA
COMPARARE

Tropismo midollare.
con : **Oxal-ac, Gels, Phos, Sil, Arg-n.**

MENTALE

Esaurimento ed insonnia in soggetti affaticati intellettualmente, dopo un notevole impegno mentale.

INSONNIA - R 14

- Si svegliano solo dopo 2 ore : intossicati
- Sonno notturno : peggiorato: LUES, FLUOR, MERCURIALI
- **Puls, Bry** (2:00-3:00), **Kali-c** (2:00-3:00), **Thuja** (4:00), **Nux-v, Coff, Arg-n**
- Gli IODICI la mattina evitano gli impegni per l'insonnia
- Sonno bocconi è SIC

MODALITÀ

Aggravamenti:

Caldo

Miglioramenti:

Pressione

SINTOMI GENERALI

Sforzi mentali nei **diabetici**. Meno sudori.

SINTOMI LOCALI

SNP

Farmaco tipico delle paraplegie e paralisi (**Phos** dal basso verso l'alto, **Zinc, Pic-ac**) con bruciore (come tutti gli acidi) lungo la colonna e sensazione di debolezza della colonna vertebrale (**Phos, Zinc, Pic-ac**).

Paralisi Vannier

Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels,
Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

Priapismo esagerato doloroso di origine midollare.

SINTESI CLINICA

Tropismo midollare. Farmaco tipico delle paraplegie con bruciore lungo la colonna e sensazione di debolezza della colonna vertebrale. Paralisi. Priapismo esagerato doloroso di origine midollare.