

PODOPHYLLUM PELTATUM

(Podo)

Diarrea al mattino da discinesia mattutina della colecisti
Acuto x gastroenteriti: **Ars, Veratr, Podo, Eup-per** (gastroenterite influenzale)

Borborighmi e meteorismo abbondanti rumorosi, flatulenze e crampi, accompagnati quasi sempre da scariche diarroidiche.
Sensazione di vuoto addominale dopo la defecazione.

KN : **Diarrea con feci fetide giallastre espulse a getto.**
COSTITUZIONE SULF
DIATESI PSO
FISIOLOGIA Ipercinesi della colecisti
COMPLEMENTARE/SINERGICO **Arg-n ansia che scarica sulle vie biliari (ipercinesi)/**
COMPARARE con : Aloe, Chelid, Merc, Nux-v, Sulph.
DD

- Peristalsi

Peristalsi – colecisti	
attiva	Sep
frena	Podo
regola	Puls

- **Calc** stitico senza colite

AGISCE

Sulla colecisti.

MODALITÀ **Podo** intolleranza alle ostriche (**Lyc, Brom**).

Aggravamenti

— Orari:

- Al risveglio alle 7:00 am (FOSF, Thuja, Nux-v, Natr-m, **Podo**)
[tutti i sodici peggiorano alle 10-11, Am-m. (testa e petto), Bry, Kali-bi, Lach, Sulph].
- A mezzanotte (**Ars, Bell, Dros, Nitr-ac, Nux-v, Phos, Podo, Rhus-t**) e
- dopo mezzanotte
- dalle 2:00 alle 4:00 (**Podo, Kali-c**).

— Dentizione (**Aeth, Bell, Bor, Calc, Calc-p, Cham, Kreos, Magn-p, Phyt, Podo, Rheum**).

Miglioramenti

Sdraiato sul ventre,
Con la frizione,
Con la diarrea (cefalea), (diarrea provoca sollievo **Abrot, Natr-s, Zinc**).

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze

Costipazione che si alterna a diarrea.
Cefalea che si alterna a diarrea abbondante espulsa a getto.

Lateralità

dx

Avversioni:

Frutta (coliche), ostriche

SINTOMI GENERALI

- Astenia, inappetenza, sub-ittero.
- Lingua umida con senso di bruciore.
- Intolleranza al latte con diarrea mattutina giallastra (2 – 3 scariche).

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)			
Patologie più gravi scendendo verso il basso			
SULF/MUR – TUB			SULF - PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc		
↓			↓
Mag-m	Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c

				Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓				↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano ↓	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano ←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi ↓	
↵	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).				↵
		↓			
Componente esagerata LUES	Ars			Stato Coleriforme e Tifoide	
	Bapt				
	Veratr				
	Camph				
	Cupr				
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy					

- Gastro-enteriti acute con
- Turbe epatiche gravi da **ipercinesi della colecisti** con dolori ipocondrio **dx** e punto cistico molto dolente.
- Colon **dx** molto disteso e dolente alla palpazione.
- Feci abbondanti giallastre e fetide. **Diarrea giallastra a getto**, peggio al mattino.

SINTOMI LOCALI

SNC: Cefalea cronica, periodica, preceduta da disturbi visivi con sensazione di pressione violenta alla testa, bocca amara e nausea. Tutto scompare se il malato ha la diarrea.

Idrocefalo

Idrocefalo
Apis, Merc, Podo
Calc-p, Sulph,
Sulph 6 CH e Calc-p 6 CH alla madre in gravidanza

Digerente:

Gastroenteriti : Acute con poco vomito e molta diarrea. **Podo** per diarrea al mattino da discinesia mattutina della colecisti, **Eup-per** gastroenterite influenzale (anche **Ars** in acuto, **Veratr** freddo pallore, senso di lipotimia).

Diarree prolungate e spossanti. Abbondante diarrea acquosa poltacea (polenta), con bisogno imperioso, specie al mattino presto (discinesia mattutina della colecisti) e notturna, preceduta da dolori, borborigmi (lavandino che si svota) e flatulenze, seguita da tenesmo e debolezza generale con **sensazione di vuoto all'addome**.

Malassorbimento intestinale la diarrea prolungata può provocare dimagrimento.

Colon irritabile Colon dx molto disteso e dolente alla palpazione, dolori ipocondrio dx e punto cistico molto dolente con feci fetide e **giallastre espulse a getto**. Migliora se si sdraia sul ventre.

SINTESI CLINICA

SULF/PSO. Gastroenteriti acute da discinesia della colecisti con poco vomito e molta diarrea. Malassorbimento intestinale con prolungate, abbondanti diarree. Feci fetide giallastre espulse a getto. Tenesmo. Debolezza generale. Sensazione di vuoto all'addome.

TERAPIA/DOSE

Si deve escludere la celiachia (**Chin**).

Terapia generica delle diarree. Anti-diarroico **R4**

Si dà **Ars** (perché nelle diarree c'è sempre putrefazione delle proteine), se c'è nausea si dà **Ip**, se dopo 2 ore non hanno funzionato si dà **Podo** (farmaco della colecisti) che funziona in 2 ore. Si possono dare insieme **Ip**, **Podo**, **Veratr**.
Anche nella diarrea da Amoxicillina : **Arg-n** + **Crot-t**, poi **Podo**.