

PYROGENIUM

(Pyrog)

Stati settici gravi (anche prevenzione)

KN : **Discordanza polso/temperatura (polso frequentissimo, brividi, ma temperatura poco elevata).**

COSTITUZIONE Pluricostituzionale
DIATESI Molto LUES
FISIOLOGIA Provoca uno shock al sistema immunitario. **Pyrog** 200 CH. di vasto uso veterinario.
COMPLEMENTARE/SINERGICO **Ars, Bry/ Hep** si associa a **Pyrog**.
COMPARARE con : **Echin, Carb-v, Ars, Lach, Rhus-t, Bapt.**
DD Quando c'è dissociazione tra polso e temperatura si usa **Pyrog**.
EVOLUZIONE **Hep.**

MENTALE Marcata agitazione, delirio, logorrea, perdita di coscienza. Sensazione di essere ricchissimo, quindi vuole spendere.

<u>Umore negativo - Depressione</u>	
Mancanza di reazione	Carb-v, Lauro, Mosch, Op, Sulph, Nosodi (Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja)

MODALITÀ Acute :

Aggravamenti

Freddo.
Riposo.
Alle 19.

Miglioramenti

Calore.
Movimento.

SINTOMI GENERALI Febbre. Emorragie. Pallore cadaverico. STATI SETTICI e loro conseguenze. Indolenzimento generale. **Discordanza polso/temperatura (polso frequentissimo, brividi, ma temperatura poco elevata)**. ESCREZIONI FETIDE. TUTTO È FETIDO. Movimento delle ali nasali (**Lyc, Phos**). Letto sembra duro. Consapevolezza del proprio cuore.

<u>Sepsi</u>	
Febbre settica (o brividi presenti ma febbre non segue)	Pyrog 30 CH. SE fase settica avanzata con brividi che si susseguono: Lyc
Stati settici gravi	Crot-h + Pyrog
Infezioni gravi, Coma + gangrena	Tarent-c + Pyrog + Anthraci

<u>Ascessi</u>	
Ascessi (Sulph è sempre centrifugo).	Guaj, Hep 30 CH, Pyrog 200 CH
Si prescrive sino a completa guarigione se esiste una quota residua di flogosi.	Hep 30 CH + Pyrog 200 CH
Nella sperimentazione provoca stato settico febbrile : - dissociazione del polso e della temperatura (mastiti : temperatura ↓, polso ↑). - pessimo odore di tutte le secrezioni - ansietà, agitazione, indolenzimento	Pyrog Pluricostituzionale (più SULF). Sempre a 200 CH da tenere in casa. Non va dato in anticipo rispetto alla fase di stato. A colliquazione avvenuta agevola il drenaggio.
Rimedio più specifico della suppurazione acuta. La regione colpita è molto dolorosa ed ipersensibile al minimo tatto ed al freddo. Meglio con il caldo. Spesso con Pyrog	Hep

<u>Anti-suppurativi</u>
Hep, Pyrog, Anthraci, Carbolic-ac, Tarent-c, Guaj
Suppurazione cutanea (o stati settici) : Arn (in generale) + Pyrog

Rischio di complicanze settiche : chirurgia, ustioni, punture d'insetto: **Arn, Rhus-t**. Se si teme il propagarsi di un'infezione anche **Pyrog**.

Profilassi metriti, mastiti, e diarree : **Lach + Puls + Sabin + Echi + Pyrog + Caul**.

Punture d'insetto

Punture d'insetto
Puntura di zanzara: pomata : Calendula TM 4-10%, Apis 5 CH, Led 5 CH

SINTOMI LOCALI

Infettivologia

Influenza (R6 gtt + Echin + vit C - 1 o 2 cp x 3). **Dissociazione tra polso e temperatura => Pyrog** invece di Hep.

Testa

Cefalea pulsante. TAS elevato (30 CH x 2 mesi)

Naso affilato (**Veratr** colera, **Pyrog**, **Op**, **Mur-ac**, **Ars** antiasmatico, **Ant-t**).

Lingua secca **rossa liscia come se fosse verniciata** con alito assai cattivo.

Otiti purulente (dopo paracentesi o otorrea spontanea), azione anti-suppurativa, anche acuta che si prolunga. Secrezioni nauseanti. Dolente. Sente i battiti cardiaci. **Pyrog + Hep**.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c . Otite nel bambino: Mang , Caps . Chinin-s	
Purulente	
dopo paracentesi o otorrea spontanea	
Azione antissuppurativa, anche acuta che si prolunga. Secrezioni nauseanti. Ammaccato. Sente i battiti cardiaci.	Pyrog 5 o 30 CH + Hep 200 CH

Vene

Ulcere venose senza componente settica : **Anthraci**, **Tarent-c**.

Se non funzionano : **Anthraci** + **Pyrog** + **Crot-h** + **Lach**.

Digerente

Lingua fetida secca rossa liscia con alito assai cattivo (**Pyrog** stato grave setticemia).

Vomito fecaloide.

Coliche. Diarrea.

Ginecologia

Annessiti acutissime, febbre poco elevata e polso frequente, **Pyrog**.

Mastiti in gran parte farmaci degli ascessi	
<u>Mastite subacuta</u> tendente alla cronicità. Presenza di fistole che secernono pus . Migliora con applicazioni fredde. <u>Fistole</u> anali.	Calc-s 30 CH ogni 2-3 ore +
Simile ad Hep . Si può associare ad esso. Indicato quando c'è <u>dissociazione tra polso e temperatura</u> . Farmaco di vasto uso veterinario.	+ Pyrog 200 CH

Mastiti acute in veterinaria: **Bell**, **Phyt**, **Apis**, **Bry**, **Pyrog**, **Lac-c**, **Con**.

Post-partum		
Dall'inizio del travaglio a 10 gg dopo il parto		Pyrog 5 CH + Hep 30 CH x 2
Per alcuni giorni dopo il parto		Arn 5 CH + Chin 5 CH
Cesareo (taglio chirurgico)	Cicatrizzaz si frena la tendenza alle cicatrici cheloidi	Staphy
	Stress	
	Frustrazione (non sono capace di partorire)	
Depressione post-partum	Sodici	Sep 200 CH riduce le complicanze del post-partum
	Note LUES	Hyosc

SINTESI CLINICA

Si usa in tutte le forme di suppurazione e di sepsi, anche come preventivo.

Particolarmente indicato con dissociazione tra polso elevato e temperatura poco elevata, lingua liscia e rossa come se fosse verniciata, consapevolezza del proprio cuore, con il letto che gli sembra duro, escrezioni fetide.

Tifo. Ulcere varicose specialmente se maleodoranti. Decubiti non cicatrizzati (cicatrice, es.: **Nitr-ac**). Seps. peritoniti. Colera. Appendicite settica. Avvelenamenti da gas fognari. Aborti.

TERAPIA/DOSE **Pyrog** 30 CH provoca modificazioni immunitarie.

Non si deve aspettare la setticemia per somministrarlo. Non funziona tanto sull'ascesso (**Hep**), ma come preventivo e post-operatorio (insieme ad **Arn** e **Rhus-t**).

Anche nelle febbri strane/sconosciute che possono portare alla setticemia. Anche nelle forme autoimmuni.

In tutte le suppurazioni.