

RADIUM BROMATUM

(Rad-br)

Raggi gamma → irritazione e necrosi tissutale

DIATESI Prevalente TUB

FISIOLOGIA Il Radio ha un'azione distruttiva sulle cellule viventi e particolarmente sulle cellule di neoformazione. **Rad-br.**

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Rad-br simile a **Rhus-t**, ma più profondo e elimina più TUB e SIC. Nelle artriti complementare di **Rhus-t**.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / **Rhus-v, Tell.**

COMPARARE con

Anac, X-Ray, Rhus-t, Sep, Uran, Ars, Puls, Caust, Tell.

DD

Rad-br più profondo e più sistemico di **X-Ray**.

AGISCE

Elimina i blocchi SIC. Azione ipotensiva (come tutti i farmaci SIC).

MENTALE

Astenici moralmente depressi,
Paurosi che temono la solitudine e l'oscurità,
Irritabili e molto suscettibili.

MODALITÀ

Caloroso

Aggravamenti

- Calore del letto,
- Di sera,
- Di notte.

Miglioramenti

- Calore (doccia bollente e con i bagni caldi, come **Rhus-t**, a differenza di **Fl-ac**).
- All'aria aperta.
- Dopo mangiato
- Dopo aver dormito.
- Movimento

Alternanze: Stipsi e diarrea

Avversioni: Zucchero, carne in genere.

Desideri: Carne di maiale

SINTOMI GENERALI

Astenici. Utile nei disturbi che seguono l'uso dei raggi X.

Vertigini. Cefalee.

Anoressia.

Stipsi.

Dolori vaganti che migliorano al calore.

Azione ipotensiva.

Prurito

Il prurito in genere è peggiorato dal calore e dal sudore e dal contatto con la lana, ma questo non è sempre omeopaticamente valido. [scabbia !]

Prurito bruciante e pelle ispessita. Rimedio generico del prurito.

Rad-br

SINTOMI LOCALI

SN

Nevralgie dopo raggi X. Dolori vaganti (**Puls, Nitr-ac**).

Cute

Simile a **Rhus-t** ma con azione più profonda, come **X-Ray**. Molte eruzioni specie da raggi X. Eczemi. Psoriasi. Nei. Verruche. Duroni. Il tutto con forte prurito che peggiora nel calore del letto (come **Sulph**). Secchezza della cute e delle mucose. Eruzioni su cosce e genitali.

Osteo-articolare

Stati reumatici provocati dalle scorie dei tessuti distrutti dopo radioterapia.

Spondilosi della nuca molto simile a **Rhus-t** rispetto al quale è molto più profondo.

Spondilite anchilosante

Ha sempre una forte componente TUB, poi c'è anche una componente LUES e SIC		
Sensazione di debolezza nella regione lombare (come Kali-c). Anche <u>ex radiazione</u> .		Rad-br

Circolatorio

Angiomi (gli angiomi sono fegato).

Oncologia:

Rhus-t	→	Rad-br ha un'azione più profonda di Rhus-t , come X-ray	→	X-ray più profondo di Rhus-t : trasforma la SIC in PSO
---------------	---	--	---	--

Radiodermiti : ulcere profonde, eritemi seguiti dalla caduta dei peli, prurito in tutto il corpo con sensazione di bruciore che migliora grattandosi. **Rad-br**. Dopo ogni seduta radioterapica applicare una pomata alla **Calend** sulla zona irradiata. Non effettuare l'applicazione della pomata prima della seduta.

Tumori maligni in atto : terapia di sostegno : **X-Ray**, **Rad-br**.

Anche **Ars** complementare di **Rad-br** e di **Chin**, simile a **Rhus-t** ma più profondo e più LUES. A carico di ogni organo, cachessia neoplastica, leucemie. È uno dei più grandi anti neoplastici: emopoietico, linfatico, stomaco.

Adenocarcinoma della mammella si usano per le complicanze dell'allopattia :

Edema	Ham (FOSF) 5 CH. Apis (MUR) 5 CH. Natr-s (SULF) 5 CH. Graph (pluricostituz) 5 CH. Kali-c (CARB) 5 CH. Rad-br (eliminatore) 9 CH.
Dopo Radioterapia	X-Ray 9 CH. Rad-br 9 CH. Cob 9 CH

Edemi da radioterapia. **Rad-br**.

Linfedemi	
Linfedemi traumatici o post-traumatici (intervento sulla mammella, Rx terapia)	
Linfedemi da stasi venosa	
Linfedemi da malattie sistemiche	

SINTESI CLINICA

TUB prevalente-SIC. Utile nei disturbi che seguono l'uso dei raggi X. Più profondo di **Rhus-t**. Soggetto caloroso.

Vertigini. Cefalee. Anoressia. Stipsi. Nevralgie, stati reumatici ed edemi dopo radioterapia, radiodermiti. Terapia di sostegno per le neoplasie maligne.