

RADIX
(Radix)

CELLULITE		
⌌ Bad (TUB) La cellulite dei fosforici ⌌ Phyt (LUES) ⌌ Elaies	INSUFF di CIRCOLO (TUB) ⇓ Angelica Insufficienza + artrosi (diluizione bassa) ⇓ ARTROSI Iniziale Rhus-t, Aran (arti sup) ⇓ Graph ⌌ RADIOTERAPIA ⇓ X-Ray	⌌ Sil (TUB) ⌌ Natr-s (SIC) ⌌ Dor
Fosforiche o muriatiche (cellulite dei fosforici). Infiltrazione indurita del derma. Cicatrici cheloidee pallide. Freddolose. Ipertiroides		Bad 5 CH
Edema duro dopo <u>Rx-terapia</u>		Dor 5 CH
Zone indurite con <u>parestesie e anestesie</u>		Elaies 5 CH
Coinvolta la <u>parte alta</u> . Infiltrazione cellulitica del <u>ginocchio</u> artrosico e sul rachide nella sindrome trofo-statica menopausale. Cute da <u>mixedema</u> . Geloni.		Graph 5 CH
Cellulite dolorosa. Obesità. Lipomi (SIC + LUES). Cicatrici dure infiammate doloranti. Artralgie. <u>Mastopatia (obbligatorio)</u>		Phyt 7 CH
Lipodistrofie. Placche nodose (<u>tumefazioni</u>) di indurimento sottodermico in portatrici di <u>artrosi dell'anca</u> , sacroileiti, lombalgia. Idrolipopessia, sindrome premestruale.		Radix 7 CH
<u>Simile a Badiaga</u> . Cellulite grassa. Pelle pallida e pergamenacea.		Sil 7 CH
Coinvolta la <u>parte bassa</u> . Sempre. Specie per etiologia iatrogena o infettiva e nelle manifestazioni adipocellulitiche del bacino, natiche, cosce, fino alle caviglie.		Thuja 7 CH
Cellulite ipersensibile e <u>dolorosa</u> a livello di addome e cosce		Natr-s 7 CH
<u>CARB/PSO-SIC</u> (<u>diabete</u> nel CARB).		Bov 7 CH
<u>MUR</u> . Tindal (proteine dell'umor d'acqua)		Kali-m 7 CH , agisce sulla formazione della fibrina
SIC + TUB	Thuja +	Bad, Sil, Kali-m
SIC + LUES		Dor, Elaies, Phyt
SIC + PSO compensata		Graph
R42 (componente circolatoria) - R59 (riequilibrio endocrino) - R60 (drenatore ematico e linfatico) - R63 (flebopatie periferiche)		

Organoterapia	Hepatine 4 CH + Renine 4 CH + Muquesedu Colon 4 CH + Tissuectico-endothelial 7 CH + Axe-cortico-hypothalamique 9 CH
---------------	---