

RUTA GRAVEOLENS

(Ruta)

KN :
COSTITUZIONE
DIATESI
ETIOLOGIA

Flogosi, noduli, rigidità e dolore a carico dei tessuti periarticolari e periostio.

CARB
SIC
Traumi

Traumi o Sforzi ripetuti	
Traumi cranici con lesioni	Arn
Terminazioni nervose periferiche – dito schiacciato, coccinodinia da trauma	Hyper
Conseguenze psichiche dei traumi cranici	Natr-s
Traumi tendinei	Rhus-t
Traumi tendinei. Affaticamento visivo	Ruta

FISIOLOGIA

Tropismo Istologico	Flogosi e noduli del <u>tessuto periarticolare, sclera, corioide</u> .	Caust, Rhod, Rhus-t tutte le guaine ed i tendini, Ruta
----------------------------	--	--

COMPLEMENTARE/SINERGICO

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Calc-p
--- / **Camph**

COMPARARE

con : **Rat, Card-m, Jab, Phyt, Rhus-t, Sil, Arn.**

AGISCE

- Tessuto periarticolare. Sclera e corioide :

Ruta	Periostio, sclera, corioide
Rhus-t	Tutte le guaine ed i tendini
Arg-m	Cartilagini
Caps	Processo mastoideo
Rhod	Prevede il temporale
Caust	Agisce sulla fibrosi/sclerosi

- Anche sulla cute, mucose, utero.

MODALITÀ

Aggravamenti:

Freddo umido, temporale, riposo, sforzo visivo, contatto.

UMIDO	
> con il clima umido	Caust e Med (SIC con modalità inversa), Asar, Cham, Hep, Nux-v, Sab, Spong
< con i cambiamenti di tempo	Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang-met, Natr-s, Nitr-ac, Nux-v, Petr, Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor, Puls, Rhod, Sep, Sil.
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
	E anche : Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Ruta.

Miglioramenti:

- Bagno caldo. Applicazioni calde anche sugli occhi
- Con il movimento sin dai primi movimenti (**Calc-f, Dulc** SIC, **Rhod** SIC, **Ruta** periostio), deve muoversi con continuità per stare meglio.

SINTOMI GENERALI

Farmaco reumatologico specialmente del periostio.

— Dolore

- Multiforme :

- § Le articolazioni : sensazione di contusione, di dolentia globale
- § Dolore tendineo che peggiora alle cosce con estensione delle gambe
- § Dolore contusivo a livello del coccige

Dolore Contusivo

Trauma con ecchimosi/ematoma	Arn
Antinfiammatorio NON per dolori osteo-muscolari, MA per dolori articolari <u>improvvisi</u> , più improvviso di Arn	Acon
Periostio	Ruta
Tendini dei muscoli	Rhus-t

- Anche **farmaco dei dolori cronici** che permangono (**postumi**) anche dopo il consolidamento delle fratture, specie se peggiorati dal freddo. Il dolore è inizialmente acuto, bruciante e tende a persistere per mesi dopo la lesione.
- Sensazione di incrinatura e di indolenzimento generalizzato : **Fatica estrema con sensazione generalizzata di ammaccatura**. Dopo traumi o sforzi ripetuti dei muscoli, dei tendini e del periostio.
- Alla colonna vertebrale ed alle membra. Non può restare coricato sulla schiena tranquillo ed è costantemente agitato.

— Verruche.

SINTOMI LOCALI

Cardiologia

Angor complicato da cervico-dorsalgie (**Act-r, Bry, Rhus-t, Sulph, Ruta**).

Ortopedia

Contusioni del periostio dove l'osso è vicino alla superficie (tibia, cresta iliaca, olecrano). Contusioni profonde, con coinvolgimento osseo, con marcata sensazione di rigidità (**Ruta**, complementare **Rhus-t**).

- Traumi tendinei.
- Fratture di ossa vicine alla superficie cutanea (tibia, cranio, rotula).
- Distorsioni specifico comunque dei traumi tendinei, specialmente dei tendini **flessori**. Lesioni dolorose del periostio. Meglio con il calore, con il bendaggio, con il movimento leggero.
 - § Gomito del tennista,
 - § Polso del chiropratico.
- Artriti

Artriti		
Tunnel carpale	Rhus-t + Ruta	
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Tiosin (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)
Artrite degenerativa e/o sclerosi vascolare dell'anca	sin	Natr-s
	dx	Hyosc
Artrite cronica e/o deformante e/o degenerativa	Caust (accorciamento dei tendini)	

- Ustioni,
- Traumi chirurgici,
- Colpo di sole, collasso di calore,
- Lesioni della spina dorsale,
- Commozione cerebrale.

Immunologia/ Reumatologia

Patologia articolare acuta : Artrite reumatoide, Artrite settica, Artrite gottosa, Febbre reumatica		
Rimedio principale di buona parte delle forme reumatiche. ARTRITI REUMATOIDI non lievissime e FIBROMIOSITI. <u>Cutaneo sopra l'articolazione (Herpes, Vescicole, Calli, Psoriasi).</u> Dolore che peggiora al primo movimento (risveglio) e migliora con l'attività. Peggiora con il freddo umido. La sera torna il dolore per il troppo uso. Migliora dopo bagno caldo e con l'attività.		Rhus-t (insieme a Ruta farmaci dei tessuti periart e dei tendini: <i>Artriti + tunnel carpale</i>) il contrario di Bry
Sensazione di <u>assoluta rigidità</u> . Polsi, mani, caviglie, piedi (ciclisti). Agisce sul <u>periostio</u> . Simile a Rhus-t , tuttavia minor miglioramento con il calore ed il movimento. Peggio anche a seguito di movimenti lentissimi (dolore all'intenzione del movimento).		Ruta insieme a Rhus-t farmaci dei tessuti periarticolari e dei tendini

Ginecologia: Eugenetica durante la gravidanza :

Cura individuale della madre + :		
Generica tendenza abortiva:	Lues	
Prime settimane	Vib	CARB-SULF
	Apis	MUR-FOSF

II e III mese	Kali-c	CARB o CARB-SULF
IV mese	Apis	Evita che si raccolgano liquidi che possano scollare i tessuti
Dal V al VII mese	Sep	Ipfisi: iperprolattinemia. 50%.
VII mese	Ruta	A dosi ponderali provoca aborto
Tutta la gravidanza	Puls	Arma eccezionale. Se NON è Puls , a bassa diluiz, aiuta il trofismo della placenta e fa ruotare il feto. Se è Puls per 1 mese a 5 CH e poi a 30 CH.
	Ip	Nausea
	Gels	Dopo paure e/o trauma psichico
	Arn	Dopo trauma fisico o psichico

SINTESI CLINICA

CARB/SIC. Flogosi, noduli, rigidità e dolore a carico dei tessuti periarticolari e periostio.

Traumi tendinei e chirurgici, contusioni, commozione cerebrale, distorsioni, fratture, lesioni alla colonna vertebrale, ustioni, collasso da calore. Dolore multiforme, sensazione d'incrinatura ed indolenzimento generalizzato. Farmaco dei dolori cronici, fratture, distorsioni, contusioni del periostio. Traumi tendinei.

Anche artrite reumatoide, artrite settica, artrite gottosa, febbre reumatica.

TERAPIA/DOSE

Nelle sinoviti, borsiti, traumi degli apparati legamentosi, usare la 5 CH ripetuta spesso durante la giornata.

Per i disturbi oculari usare alla 9 CH, ripetuta da 2 a 4 volte il dì