

SARSAPARILLA OFFICINALIS Liliacee/ Smilacee
(Sars)

KN : Cronico, geriatrico.
Il bambino grida prima, durante e soprattutto alla fine della minzione.

COSTITUZIONE CARB-SULF
DIATESI PSO-SIC-LUES
ETIOLOGIA Alcolismo
FISIOLOGIA Piccoli farmaci drenanti : **Berb** e **Sars** (drenanti renali), **Led**.
COMPLEMENTARE/SINERGICO Merc, Sep.
INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Bell**.
COMPARARE con: **Berb, Lyc, Natr-m, Petrol**.
AGISCE Metabolismo, cute, apparato urinario, circolazione venosa.

MENTALE Post-pensione. Depressione, scoraggiamento, cattivo umore. Calo di memoria

MODALITÀ
Aggravamenti

- Con l'umidità, freddo,
- In primavera (i MUR ed i FOSF, **Ant-t.**, **Brom.**, **Crot-h.**, **Lach.**, **Sars**).
- Dopo aver urinato.

Miglioramenti

- Con il calore.
- Stazione eretta Urinando in piedi.

Lateralità

dx

SINTOMI GENERALI

Debolezza. Inappetenza.

Dimagrimento con cute arida e grinzosa soprattutto al collo (**Sars** trofismo, **Lyc** 50% CARB. Mani sottili, vecchieggiante collo tipico magro con rughe).

Calcolosi renale. Calcolosi. Dolore loggia renale dx. stranguria. Grossi calcoli vescicali. Minzione più facile in ortostatismo. Nefropatie/croniche. Urina scarsa fioccosa fortemente ematica e con deposito di sabbia biancastra. **Dolore** acuto alla fine della minzione. **Edemi** diffusi agli arti inf ed al volto.

SINTOMI LOCALI

Volto

Intossicati con naso rosso da accumulo di scorie gottose (**Psor**, **Sulph**. Piccoli farmaci drenanti : **Berb**, **Led**, **Sars**).

Cute

Tendenza a screpolarsi. Secca, arida, grinzosa con scaglie, soprattutto intorno al collo (**Sars**, **Lyc**). Eruzioni per lo più umide al volto ed ai genitali.

Circolatorio

Edemi diffusi agli arti inferiori ed al volto. Stasi venosa con varici.

Reumatologia

Artralgie croniche. Noduli gottosi assai dolorabili.

Urologia

- Nefropatia croniche, anche gottosa
- Calcolosi renale. Dolore loggia renale dx, stranguria. Grossi calcoli vescicali.
- Urine scarse minzione, fioccoso fortemente ematiche, con deposito di sabbia biancastra sulla biancheria.
- Dolore acuto alla fine della minzione. Dolore ai reni < a dx (coliche renali).
- Urina > stando in piedi (spasmo del collo della vescica)
- **Bambino che urla prima, durante e dopo la minzione.**

Ginecologia

Mestruazioni scarse e irritanti. Mammelle avvizzite con capezzoli retratti.

SINTESI CLINICA

CARB-SULF/PSO-SIC-LUES. Farmaco drenante renale si usa in caso di calcolosi in bambini che urlano prima, durante e dopo la minzione.

PATOLOGIE

Senilità. Emaciazione. Eruzioni umide e prurienti. Urolitiasi. Coliche renali. Cistiti croniche. Scirri del seno. Gotta. Artrite.