

SENNA (Senn)

KN :

Chetosi

ETIOLOGIA

Affaticamento fisico intenso, shock traumatico od emotivo, collera violenta

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Complementare/Sinergico	
Febbre	Bell
Disturbi digestivi	Ant-c
Vomito	Ip
Brontolone insoddisfatto	Cham
Chiede da bere o da mangiare, ma vomita subito	Phos, Phos-t
Sete. Gusto amaro eccetto che per l'acqua	Bry
Vomito scuro	Ars
Vomita acqua, trattiene i solidi	Bism
Cupr, Cocc, Chin, Lyc, Calc, Natr-m	

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Nux-v, Cham.

COMPARARE con : Kali-c, Jal.

EVOLUZIONE Lyc rimedio di fondo.

MENTALE

Agitazione con forti grida e anche torpore e prostrazione, sonno agitato, insonnia, urla, pianto (Borx, Lac-c, Cham).

MODALITÀ

Aggravamenti

Per l'assunzione di cibi.

Per il tempo umido e piovoso.

Avversioni:

Cibi grassi

SINTOMI GENERALI

- Alterazione rapida dello stato generale, pallore del viso, debolezza muscolare, elà notte vampate di calore.
- Affezione acuta, più o meno febbrile: rinofaringea, digestiva, malattia eruttiva;
- Diabete con acidosi

Acetonemia			
A)	Crisi più frequenti nel bambino apparentemente asintomatiche, in cui la diagnosi viene fatta unicamente perché l'alito ha odore di frutta acida (spesso CARB)	1) Regolaz della dieta + Senna 5CH	
		2) Prevenzione + Senna 30 CH	
	Nell' intervallo tra le crisi: Sequenza antiPSO di Kent: Lyc → Sulph → Calc		
B)	Crisi più gravi che insorgono bruscamente con vomito, febbre, cefalea, agitaz, spossatezza, crampi addominali, sudoraz fredda, collasso. Alito odore acetone, Corpi chetonici nelle urine. Intolleranza per i solidi e i liquidi; la crisi può durare dai 2 agli 8 gg.:		
	Molto vomito con lingua pulita e poca diarrea	Ip 5 o 30 CH	Diabete
	Se crampi addominali e coliche	Coloc, Cupr, Ars	
	Se diarrea indolore e collasso	Veratr	Farmaco di collassi
	Negli intervalli cicli di Kent	Lyc → Sulph → Calc	

- Alitosi

Alitosi	
Fortakel, Porfakel	
Alitosi solo da acetonemia	
Prime ore del giorno	Puls
Tutto il giorno:	Senn + Bapt
In pediatria	

Mattutina. Ristagno notturno di mucosità giallo denso.	Puls
Continua. Puzzolentissimo. Diarree putrefattive violente.	Bapt

SINTOMI LOCALI

Cute

Eruzione di piccole vescicole urenti.

Cardiologia

Angor complicato da patologia digestiva (**Nux-v**).

Digerente

- Pancreatite (**Phos**, **Senn**).
- Diabetico con acetonuria.

Sintomi :

- § nausea, vomito, odore aromatico dell'alito;
- § dolori addominali in genere abbastanza forti;
- § meteorismo . flatulenza, aumento di volume del fegato.
- § diarrea acquosa, giallastra o verdastra, con bruciori rettali e anali (**Ars**) e tenesmo (**Merc**); costipazione.

Urologia

Calcolosi renale. Ossaluria abbondante. Rimedio drenante gli ossalati Acetonico.

SINTESI CLINICA

Acidosi/chetosi. Diabete con acidosi. Alitosi. Agitazione con forti grida e anche torpore e prostrazione, sonno agitato, insonnia, urla, pianto. Aggrava per l'assunzione di cibi.