

STAPHISAGRIA

(Staph)

Antispastico. Post-intervento. Collera/frustrazione repressa

KN : **Paura di perdere il controllo sulle proprie emozioni e quindi sulle proprie relazioni affettive.**

COSTITUZIONE Policresto. CARB-SULF molto scompensato.

DIATESI SIC (notevole)-LUES (Colite ulcerosa), poi anche TUB-PSO

Caust, Con, Nitr-ac, Staph stanno alla convergenza tra SIC e LUES.

ETIOLOGIA SESSUALITÀ, ABUSO SESSUALE

Bambini: Contesto familiare maltrattante, genitori separati, assenza di uno dei genitori, genitori alcolisti, bullismo scolastico.

Donna Moglie maltrattata, mobbing

Uomo Mobbing, licenziamento. Specialmente per i dirigenti pensionati (**Staph, Aur, Ars**).

Comunque, in tutti quei soggetti sensibili che hanno subito qualche sorta di repressione anche minima, ma vissuta male, soggetti simili a **Puls** (sensibile coccolone) o a **Natr-m** (sensibile introverso).

Collera/FRUSTRAZIONE

Acon,
Cham otite nei bambini, piangono con rabbia,
Coloc teso, arrabbiato,
Ign,
Ip irritabile,
Nux-v va spesso in collera,
Plat dopo gli incidenti nella paura di guidare,
Staph collera trattenuta

FISIOLOGIA

- Staph** 30 CH è antispastico, 200 CH mentale.
- Staph** è tanta SIC acquisita di un grado più leggera di **Med** e con modalità inversa (migliora con l'umido come **Caust, Thuja**), più vecchio e più SIC di **Natr-m** ed è poco probabile che vada con **Hep**.
- I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e cute.

Thuja ← Lach		← SIC →		Staph → Rhus-t	
Dulc		SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+					
Rhus-t (drena anche scorie TUB)					
RHUS-T :ansioso, agitato (Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi, tonico (Nux-v), preoccupazione per gli altri (Caust), grande valutazione di se stesso (Plat). Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t è meno SIC e più PSO (più cutaneo)					
Rhus-t					
Complementari					
Costituzione SULF			Costituzione FOSF		
Natr-s			Petr		

COMPLEMENTARE/SINERGICO Thuja, Caust, Coloc

INCOMPATIBILE/ANTITODO Hyosc e **Staph** insieme si annullano, **Ran-b/ Camph**

COMPARARE con : Coloc, Caust, Ign, Phos-ac, Calad.

DD

- Cruralgia anteriore neurologica (**Staph, Gnaph**).

• Spasmi	
Migliora sdraiato	Mang
Migliora sorseggiando acqua fresca	Cupr, Plb
Migliora con il latte caldo o piegandosi	Mag-p
Migliora piegandosi o con una forte pressione	Coloc
Angina pectoris, tosse spasmodica,	Coc-c
Tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda	Ars
	Agar
30 CH oppure 200 CH mentale	Staph

● <u>Carattere compiacente per :</u>	
Codardia	Gels
Guadagnare affetto	Puls
Trattiene emozioni per paura di perdere il controllo sulle relazioni affettive	Staph

● <u>Sonno pomeridiano</u>	
peggiora	Staph
migliora	Lyc (subito dopo pranzo), Nux-v (½ ora dopo pranzo), Card-m , Chel

AGISCE

- **SNC – SN vegetativo – cute** (anche unghie, capelli) - **mucose - urogenitale**
- Ricostruzione di ferite chirurgiche farmaco principale, e post-intervento.
- Antitumorale per K benigno (prevalentemente) e anche maligno.
- Antispastico

Spasmi	Mang migliora sdraiato, Cupr migliora sorvegliando acqua fresca (+ Plb), Mag-p migliora con il latte caldo o piegandosi, Coc-c angina pectoris, tosse spasmodica, Ars tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda, Agar , Staph 30 CH (200 CH mentale)
---------------	--

EVOLUZIONE

Kent : : **Aur** (SULF che non fa attività fisica) → **Chel** → **Staph** (antispastico. DD **Puls**).

Lach e **Staph** sono SIC-LUES e si usano anche insieme.

Anche **Staph** e **Thuja** si usano insieme.

Staph per gli attacchi di ansia da anticipazione segue sia **Gels** (CARB) sia **Arg-n** (SULF).

SEQUENZA DI AGGRAVAMENTO							
Ign	→	Natr-m	→	Staph	→	Caust	→ Plb
							→ Cupr mercuriale, spasmi, terroristi

MENTALE

- **Disturbi da rabbia repressa.** **Staph** tende a controllare ogni emozione provocate da eventuali umiliazioni, alterchi, contrarietà, ingiustizie, manifestando una specie di collera trattenuta, pronta a sottomettersi, a piegarsi, con umiliazioni, dispiaceri, pur di controllare quelle situazioni cariche di emotività.
- **Frustrazioni** (non sono capace di partorire), stress, bassa autostima, depressione, piange durante la visita. tende a reprimere le emozioni
- Ma anche **Staph** è molto orgoglioso, è molto suscettibile, si offende per nulla.
- Storia piena di sofferenze, dolcezza, incapace di difendere i propri diritti, repressione della rabbia, intenso eccitamento sessuale, timida, masturbazione, sensibilità, inibizione, vulnerabilità (**Natr-m**).

QUELLI CHE PICCHIANO : **Lues**, **Fl-ac**, **Med**
QUELLI CHE VENGONO PICCHIATI : **Thuja**, **Staph**

- Eccessi sessuali (omo ed etero)
- Tachicardia ascoltando la musica
- Ansioso-fobico con ansia di anticipazione. Paura di perdere il controllo.
- Ordinato, pignolo per le cose non essenziali.
- Problemi mentali.
- Idealista

Idealisti
Sulph grandi progetti NON realizzati, Staph spirituale, sognante, va in India, Phos grandi visioni di altri, Chin psichico e spirituale → disadattato, Caust empatia + ingiustizia + analisi.

- Irritabile

Irritabilità	
Ipersensibile agli stimoli esterni : rumori, odori, luci	Sil si eccita per nulla
Irritabile in difesa	Sil , Iod , Lyc
Ansioso al minimo rumore	Sil , Caust , Aur
Estrema irritabilità	Nitr-ac
Va su tutte le furie alla vista del medico “ <i>se ne vada a casa, non l’ho chiamata, non sono malato</i> ”	Arn e Apis

Estrema irritabilità in relazione con l'affettività, stasi venosa	Aesc
Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo	Cina, Mosch, Ign
Bambini irritabili durante la dentizione con una guancia rossa	Cham
◀ con la collera	Bry, Cham, Coloc, Iod, Lyc, Magnesie, Nux-v, Staph
Reazione eccessiva	Asar, Cham, Coff, Chin, Ign, Nux-v, Puls, Staph, Teucr, Valer

- Insonnia dopo contrarietà, collera repressa oppure ipersonnia (episodi di sonnolenza), dorme di giorno ed è insonne la notte. Idee ossessive a sfondo sessuale.

Insonnia - R 14
• Si svegliano solo dopo 2 ore : intossicati • Sonno notturno : peggiorato: LUES, Fluorici, Mercuriali • Puls, Bry (2:00-3:00), Kali-c (2:00-3:00), Thuja (4:00), Nux-v, Coff, Arg-n. • Gli iodici la mattina evitano gli impegni per l'insonnia • Sonno bocconi è SIC

- Sogni libidinosi, di umiliazioni ().

MODALITÀ

Obesità : **Mangiatore per frustrazione** (SULF). Fame estrema anche a stomaco pieno.

Aggravamenti

- Calore, bevande calde (**Bry, Lach, Phos, Puls, Staph**),
- Intolleranza al latte.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR-TUB				SULF/PSO		
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastroico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.			
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓				↓		
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c		
				Ant-c Fegato sovraccaricato		
↓	Bambini intolleranti al latte Natr-p, Sep, Sil			↓		
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Reticolo venoso nucale, beve aceto	↔	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
Sintomatici colecisti/fegato						
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				←ℒ	
		↓				
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				

AA aggiungono	
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staph	

- Dopo un sonnellino, specialmente se pomeridiano (il contrario di **Nux-v**).
- Con la sofferenza psichica:
 - § emozioni (**Acon, Arg-n, Cocc, Coff, Coloc, Gels, Hyosc, Ign, Kali-p, Nux-v, Phos-ac, Puls, Staph**),
 - § dispiacere (**Ign, Natr-m, Phos-ac, Staph**),
 - § collera (**Bry, Cham, Coloc, Iod, Lyc, Nux-v, Staph, Magnesie**).
- Con gli eccessi sessuali.
- Ascoltando la musica (tachicardia) (**Ambra, Staph, Sulph**).

SINTOMI GENERALI

- **ATTACCHI DI ANSIA**

SINDROME ANSIOSA di anticipazione		
ATTACCHI DI ANSIA. Alzheimer, Parkinson, Menière. Vanno assunti già da 3 giorni prima dell'evento alla 30 CH, poi si associa Gels la sera prima e la mattina dell'evento alla 5 CH		
CARB	CARB (o SULF molto scompensato). Si blocca . Il rimedio indicato più spesso. Il paziente cerca di collaborare con il dentista, ma non ci riesce, è <u>tremante</u> ha la sensazione, caratteristica, che il cuore cesserà di battere se egli non si muove . <u>Influenza con adinamia</u> . Anche se sono utilizzati altri rimedi sarà opportuno associare 3 granuli alla 5 CH al mattino prima dell'evento. <u>Ansia prima di esami e impegni pubblici</u> . Sviene durante l'agitazione.	Gels CARB poi Staph
SULF	SULF. Non si blocca . Paura delle malattie neurologiche. Ha ansia di anticipazione, è agitato da diversi giorni prima dell'appuntamento, nervoso, manca di self-control, cammina in fretta, arriverà con largo anticipo. <u>Ansia prima di esami e impegni pubblici</u> .	Arg-n SULF poi Staph

- Tremori per rabbia o emozioni.
- Obesità. Mangiatore per frustrazione.
- Gotta (Kent : aggravamento da **Staph** : dermatite crostosa **bilaterale alle gambe a calza** durata 1 anno).
- Vertigini da distonie con alterazioni dell'equilibrio simpatico/parasimpatico
- Ricostruzione di ferite chirurgiche farmaco principale,
 - § Quando si sente che l'operazione ha invaso il vostro spazio privato, come ad esempio l'odontoiatria ruvida o il parto che coinvolge una episiotomia o forcipe.
 - § Utile anche quando il dolore o cicatrici sono lente a guarire.
 - § Migliora le cicatrici,
 - § Frena la tendenza cheloidea (anche **Hyosc** note LUES).
 - § *Dilatazione forzata di orifizi* (cistoscopia, rettoscopia, colonscopia, gastroscopia).
- Problemi sessuali, problemi urinari
- Prurito sine materia, erratico, continuamente variabile: mentre si gratta una zona, compare improvvisamente in un'altra. Palpebre, genitali. Scatenato o aumentato dalle emozioni o dalla contrarietà.

• <u>Punture d'insetto</u>	
Punture, dolore e gonfiore da	Staph Eisefelder : non pungono, Pulx Boger, Yingling : Pulci ≈ Zanzare

- Paraodontopatie (anche **Arg-n**).

• <u>Rinite allergica</u>	
Poliposi nasale	1) Calc, Con, Phos
	2) Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staph, Teucr

SINTOMI LOCALI

Cute: Cute malsana. **I farmaci SIC agiscono su pelle, unghie e capelli.**
Eruzioni a mo' di calza.
Calli

CALLI pianta dei piedi	Med (tutta), Petr (calcagno), Sil, Staph
------------------------	---

Verruche e condilomi

VERRUCHE e CONDILOMI						
Affezioni <u>SIC</u> per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
Rimedi sintomatici						
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Dulc</u>	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Nitr-ac</u>	<u>Sabin</u>	<u>Staph</u>
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staph (piccole peduncolate dolenti)			
mani	=	Sottolineate	Med, Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac, Calc			
Rimedio di fondo : Calc (SIC)						
Ipercheratosi mani : Dulc , mani e piedi : Ant-c /// Fl-ac						

Poliposi

Polipo nasale	1	Calc, Con, Phos
	2	Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staph, Teucr

Psoriasi

Psoriasi
LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico)
Sempre dopo un dispiacere, mobbing, difficoltà economiche, vissuti sempre con grande dignità. Psoriasi specie in testa. Peggiora la notte. Pediculosi ricorrente.

Occhi

Orzaio, in generale: **Puls, Staph**. Orzaio recidivante : **Apis, Puls, Staph, Sulph 10M**.

Orzaio
Infiammazione acuta delle ghiandole sebacee (di Zeiss) della palpebra alla base delle ciglia
Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma
TUB con un poco di attività SULF

Calazio SIC frustrazione : **Staph**.

Calazio
Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole sebacee interne alla palpebra (di Meibomio) da ostruzione al deflusso
Torrido, quindi più TUB
Calazio freddo non più acuto

Tumori sulle palpebre

Digerente

Reflusso gastrico (**Nux-v, Ign, Kali-c, Staph**), con infiammazione delle mucose e coorte sintomatologia di tipo psichico secondaria a disfunzionalità dell'apparato digerente.

Stomatiti aftose ed ulcero-membranose (micosi) : **Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc-s, Natr-m, Nitr-ac, Staph**.

Morbo di Chron e Colite ulcerosa.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso.			
Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità			
Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staph TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac

Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina		Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi		Sil	
Nausea e vomito		Ip	
Ulcera. Emorragia.		Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.		Ars	
Diarrea profusa → astenia		Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m	TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK		
	Sulph-i		SULF /PSO-LUES
	Sep		prolasso
	Sil		TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staph , Sulph		
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :			
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc			

Reumatologia

Artrite reumatoide : LUES + SIC.

ARTRITE REUMATOIDE (evoluzione ereditaria della sifilide)			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staph (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac, Arn, Lach
	Terapia comune	Led + Rhus-t + Bell	se LUES: Aur
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Urogenitale

Adenoma prostatico. Cateterismo vescicale: **Arn** e **Staph**. Impotenza. Polluzioni notturne.

Sabal	Prostata
Bromuri, Yohim	Organi sessuali
Staph	Sfinteri e genitali

Ginecologia: Genitali molto sensibili. Amenorrea da delusione.

Cistiti acute, croniche o recidivanti. Rimedi sintomatici. Cistalgie “*ad urine chiare*” psicosomatiche. Cistite dopo il primo rapporto. Cistite dopo coito. Cistiti traumatiche da luna di miele. Cistalgie dopo cateterizzazione. Cistiti da somatizzazione. Grande componente SIC. Getto sottile e bruciore lungo l’uretra quando NON urina.

Post-partum		
Dall’inizio del travaglio a 10 gg dopo il parto		Pyrog 5 CH + Hep 30 CH x 2
Per alcuni giorni dopo il parto		Arn 5 CH + Chin 5 CH
Cesareo (taglio chirurgico)	Cicatrizzazione si frena la tendenza alle cicatrici cheloidi	
	Stress	
	Frustrazione (non sono capace di partorire)	
Depressione post-partum	Sodici	Sep. A 200 CH riduce le complicanze del post-Partum
	Note LUES	Hyosc

Oncologia:

La diagnosi di una neoplasia genera ribellione o sensi di colpa : **Staph.**

Nel post-intervento accelera la guarigione della ferita, migliora la cicatrizzazione : **Staph.**

SINTESI CLINICA

Farmaco con grande componente SIC. Il soggetto **Staph** presenta collera/frustrazione repressa dovuta al controllo delle proprie emozioni. Paura di perdere il controllo sulle proprie emozioni e quindi sulle proprie relazioni affettive. Attacchi d’ansia. I bambini hanno un contesto familiare maltrattante, genitori separati, assenza di uno dei genitori, genitori alcolisti, bullismo scolastico. La donna: moglie maltrattata, mobbing. L’uomo: mobbing, licenziamento, specialmente per i dirigenti pensionati. Agisce sul SNC, SN vegetativo, cute (anche unghie, capelli), mucose, urogenitale.

Mangiatore e obeso per frustrazione. Irritabile ed insonne. Molto utile come antispastico e nel post-intervento.

Sessualità ipersensibile con molte fantasie.

I farmaci SIC agiscono anche su numerose patologie della cute (**Staph** : eruzioni a mò di calza), unghie e capelli.

Possono essere presenti stomatiti, Chron, Colite ulcerosa.

TERAPIA/DOSE

Per le dilatazioni forzate di orifici va somministrata in dose preventiva la sera prima o il mattino prima dell’intervento alla 30 CH o 200 CH, dopo l’intervento si somministrerà una dose alla 200 CH al dì; similmente si opererà in caso di ferite a margini netti o ad interventi chirurgici

NOTE

Il rimedio è ricavato dalla pianta della famiglia delle ranunculacee