

APOCYNUM CANNABINUM

(Apoc)

- DD**
- = ad **Apis** (edemi, gonfiori, versamenti sierosi, reumatismi, oliguria): solo che peggiora con il freddo
 - Idrocefalia (**Apis**, **Calc**, **TK**)
 - **Ant-t** : Dopo emorragia edema polmonare (il paziente non si può distendere) con rantoli
 - **Chin** : mestruo abbondante
 - **Phos**, **Ip**, **Sec** : mestruo interrotto.

MODALITÀ

Aggravamenti: Freddo.
Dopo il sonno (**Apis**, **Apoc**, **Cocc-c**, **Lach**, **Mur**, **Naja**, **Op**, **Sel**, **Spong**). Alle 5 am (**Apoc**, **Kali-i**, **Natr-c**, **Sulph** (diarrea), **TK**).
Dopo mangiato (**Bry**, **Ars**, **Aloe**, **Ant-c**, **Apoc**, **Carb-v**, **Chin**, **Crot-t**, **Ip**, **Kali-c**, **Lyc**, **Nux-v**, **Puls**).

SINTOMI GENERALI Farmaco degli edemi e versamenti di qualunque tipo. Cianosi dispnea albuminuria ed anasarca, grande debolezza (**Apoc**, **Ars**), il polso è lento e irregolare (**Dig**).

SINTOMI LOCALI

Cardiocircolatorio: Scompenso cardiaco, lesioni valvolari, degenerazione grassa del cuore.
Urologia: Uno dei rimedi più importante dell'insufficienza renale e in tutti gli stati che producono EDEMI fino all'ANASARCA con dispnea marcata, RESPIRAZ RANTOLANTE e ritenzione idrica. Nefropatie/acute. Edemi. Minzione scarsa a gocce. Dolori renali. Meglio con applicazioni calde. Molta sete. ematuria e cilindruria. No cistite. Si epatopatie e ascite.
Ginecologia: Amenorrea in seguito a ritenzione idrica, in persone anemiche linfatiche freddolose con faccia pallida ed edematosa. Marcata tendenza agli edemi locali o generali.

SINTESI CLINICA Farmaco degli edemi e versamenti di qualunque tipo. Cianosi dispnea albuminuria ed anasarca. Scompenso cardiaco. Insufficienza renale.

- TERAPIA/DOSE**
- **SCOMPENSO CARDIACO** : risposta rapida con 30 CH ogni 15 min. se il rimedio è giusto migliora alla II° somministrata → ogni 30 min, se migliora ancora → ogni 30 min → ogni ora (come nelle coliche e come nell'asma)
 - Fase terminale : **Apoc** 200 CH ogni 3 ore.
 - Diuretico 5 CH.