

CHOLERATOXINUM

COLERA	
Rubini : 5 gtt di estratto alcolico di Camph prese 3 o 4 volte al giorno costituiscono una prevenzione contro il Colera	Camph
Clarke : Una goccia di Cupr-act x 3 dovrebbe essere data sera e mattina in un po' d'acqua. Rud-dock	Camph, Cupr-act
Raue : La migliore prevenzione dal colera è senza dubbio Sulph , come consigliato da Hering la 1 CH o la 6 CH possono essere usate 2 volte al di.	Sulph
Richard Epp : I principali rimedi preventivi sono Cupr e Veratr somministrati alternativamente, uno al giorno; una goccia della tintura madre in un cucchiaino d'acqua bollita e raffreddata ogni mattino e sera. Cupr è stato raccomandato per l'uso preventivo da molti altri autori. Jousset riferisce la sua esperienza, analoga a quella del dott. Mailhet in Giappone, secondo la quale durante un'epidemia di Colera le persone a cui erano state fatte indossare piastre di rame erano sfuggite all'infezione.	Cupr, Veratr
Ars, Cupr-act, Camph, Cupr, Veratr (Hahnemann et al.). Choleratoxinum 900 CH (Friedlander bacillus) [rimedio non noto] o Camph 200 CH o Lach 200 CH o Sulph 200 CH, 3 dosi/die	